

INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER

Vragen en antwoorden over Devaron®.

In deze bijsluiter leest u hoe u dit geneesmiddel het best kunt gebruiken. Ook als u Devaron® al eerder heeft gebruikt, is het zinvol de bijsluiter te lezen: er kan nieuwe informatie in staan. Gooi de bijsluiter niet weg voordat de behandeling is voltooid. Een geneesmiddel dat aan u is voorgeschreven, mag nooit door anderen worden gebruikt.

Wat is de samenstelling van Devaron®?

Een tablet bevat 400 I.E. colecalciferol (vitamine D₃).

De volgende hulpstoffen zijn verwerkt: lactose, calciumwaterstoffosfaat, magnesiumstearaat, aardappelzetmeel, polyethyleenglycol.

Hoe is de verpakking uitgevoerd?

Een potje bevat 90 tabletten. De tabletten zijn wit (opdruk D).

Tot welke groep geneesmiddelen behoort Devaron®?

Devaron® behoort tot de groep vitamine D producten.

Hoe werkt Devaron®?

Vitamine D₃ bevordert de opname van calcium door de darmwand en zorgt voor een goede opbouw en instandhouding van het skelet.

Wie is registratiehouder van Devaron®?

Valwater BV, H.L. Wichersstraat 1 / 2, 9723 AD Groningen.

Fabrikant vrijgifte: Vemedica Manufacturing BV, Diemen.

Voor informatie kunt u zich wenden tot:

Valwater BV, H.L. Wichersstraat 1 / 2, 9723 AD Groningen.

Devaron® staat in het register ingeschreven onder RVG 09766 UAD.

Waarvoor wordt Devaron® gebruikt?

Devaron® wordt gebruikt:

- ter voorkoming van vitamine D tekort, o.a. bij het volgen van een dieet of bij gebrek aan zon;
- als onderdeel van de behandeling van verweking van de botten;
- samen met calcium ter voorkoming van stoornissen in de botvorming, als toevoeging aan andere medicijnen voor botontkalking/osteoporose.

Wanneer mag ik Devaron® niet gebruiken?

- U mag Devaron® niet gebruiken wanneer u;
- last heeft van een verhoogde bij schildklierwerking;
- een te hoog calciumgehalte heeft in de urine;
- lijdt aan de ziekte van Besnier-Boeck.

Wanneer moet ik voorzichtig zijn met Devaron®?

Grote hoeveelheden vitamine D₃ (>1.000 I.E./dag in voeding / tabletten/druppels tezamen) kunnen schadelijk zijn. Neem daarom niet meer dan aangegeven is.

Kan ik Devaron® gebruiken bij zwangerschap of bij het geven van borstvoeding?

Gebruik geneesmiddelen, als u zwanger bent of borstvoeding geeft, alleen na overleg met uw arts. Hij/zij zal beslissen of u Devaron® kunt gebruiken.

Voor zover bekend, kunt u zonder gevaar voor de vrucht of baby Devaron® volgens voorschrift gebruiken tijdens de zwangerschap of bij het geven van borstvoeding.

Kan ik Devaron® gebruiken als ik deelneem aan het verkeer of machines bedien?

Devaron® heeft, voor zover bekend, geen invloed op het rijgedrag of op het bedienen van machines.

Kan ik Devaron® gebruiken samen met andere geneesmiddelen?

Als u al geneesmiddelen gebruikt is het verstandiger uw arts of apotheker hiervan op de hoogte te stellen.

Hoe moet ik Devaron® gebruiken?

U kunt de tabletten met water innemen. Ook kunt u de tabletjes eerst oplossen in melk, pap etc. Neem contact op met uw arts als u dit geneesmiddel langer dan 14 dagen wilt gebruiken.

Hoeveel Devaron® moet ik gebruiken?

Tenzij uw arts anders voorschrijft: 1 tablet per dag, bij botontkalking wordt geadviseerd 2 tabletten per dag.

Wat moet ik doen als ik teveel Devaron® heb gebruikt?

Neem contact op met uw arts om te horen of een behandeling nodig is als teveel Devaron® is ingenomen. Neem altijd de verpakking mee; de arts kan dan meteen zien om welk geneesmiddel het gaat.

Een dieet met weinig calcium en veel water wordt aanbevolen als u teveel Devaron® heeft ingenomen.

Wat moet ik doen als ik een keer vergeten ben Devaron® te gebruiken?

Wacht tot u de volgende dosis zou nemen. Neem niet meer dan de gewone hoeveelheid in.

Heeft Devaron® bijwerkingen?

Een geneesmiddel heeft soms ongewenste effecten: zogenaamde bijwerkingen. Wanneer u teveel Devaron® gebruikt, kan een te hoog gehalte aan vitamine D ontstaan; dit komt tot uiting in lusteloosheid, gebrek aan eetlust, verstopping afgewisseld met diarree, misselijkheid, braken, dorst, veel drinken/plassen; ook hoofdpijn kan voorkomen.

Waarschuw uw arts of apotheker indien bij u een bijwerking optreedt die niet wordt vermeld in deze bijsluiter.

Hoe moet ik Devaron® bewaren?

Bewaar geneesmiddelen altijd buiten het bereik van kinderen.

Bewaar de tabletten bij kamertemperatuur (15-25°C), in de originele verpakking. De uiterste gebruiksdatum staat op de verpakking vermeld.

Heeft u nog meer vragen?

Raadpleeg uw arts of apotheker als u meer vragen hebt over dit geneesmiddel. Zij beschikken over uitgebreide medische informatie over Devaron®

De bijsluiter is voor het laatst herzien in: juli 2009.