

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER

Ciprofloxacin Mylan 200 mg/100 ml, oplossing voor intraveneuze infusie 2 mg/ml
Ciprofloxacin Mylan 400 mg/200 ml, oplossing voor intraveneuze infusie 2 mg/ml

Ciprofloxacin

Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door u dit geneesmiddel toegediend krijgt.

- Bewaar deze bijsluiter. Het kan nodig zijn om deze nog eens door te lezen.
- Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
- Dit geneesmiddel is aan u persoonlijk voorgeschreven. Geef het niet door aan anderen. Dit geneesmiddel kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als de verschijnselen dezelfde zijn als waarvoor u het geneesmiddel heeft gekregen.
- Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

In deze bijsluiter:

1. Wat is Ciprofloxacin Mylan en waarvoor wordt het gebruikt
2. Wat u moet weten voordat u Ciprofloxacin Mylan krijgt toegediend
3. Hoe wordt Ciprofloxacin Mylan gebruikt
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Ciprofloxacin Mylan
6. Aanvullende informatie

1. WAT IS CIPROFLOXACINE MYLAN EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT

Ciprofloxacin Mylan is een antibioticum dat tot de fluorochinolonfamilie behoort. Het werkzame bestanddeel is ciprofloxacin. Ciprofloxacin werkt door bacteriën te doden die infecties veroorzaken. Het werkt alleen bij specifieke bacteriestammen.

Volwassenen

Ciprofloxacin Mylan wordt bij volwassenen gebruikt om de volgende bacteriële infecties te behandelen:

- luchtweginfecties;
- langdurige of terugkerende oor- of bijholte-infecties;
- urineweginfecties;
- infecties van de testikels;
- infecties van de geslachtsorganen bij vrouwen;
- infecties van het maag-darmstelsel en infecties in de buikholte;
- infecties van huid en weke delen;
- infecties van bot en gewrichten;
- behandeling van infecties bij patiënten met een zeer laag aantal witte bloedcellen (neutropenie);
- voorkomen van infecties bij patiënten met een zeer laag aantal witte bloedcellen (neutropenie);
- blootstelling aan antrax door inademing.

Als u een ernstige infectie heeft of een infectie heeft die door meer dan één type bacterie is veroorzaakt, krijgt u mogelijk behalve Ciprofloxacin Mylan ook nog een aanvullende behandeling met antibiotica.

Kinderen en jongeren

Ciprofloxacin Mylan wordt bij kinderen en jongeren onder medisch toezicht van een specialist gebruikt om de volgende bacteriële infecties te behandelen:

- long- en bronchusinfecties bij kinderen en jongeren die aan cystische fibrose lijden;
- gecompliceerde urineweginfecties, waaronder infecties die de nieren hebben bereikt (pyelonefritis);
- blootstelling aan antrax door inademing.

Ciprofloxacin Mylan kan ook gebruikt worden om bepaalde andere ernstige infecties bij kinderen en jongeren te behandelen als uw arts dit noodzakelijk acht.

2. WAT U MOET WETEN VOORDAT U CIPROFLOXACINE MYLAN KRIJGT

U mag Ciprofloxacin Mylan niet toegediend krijgen wanneer u:

- allergisch (overgevoelig) bent voor het werkzame bestanddeel of voor andere chinolon-geneesmiddelen of voor één van de andere bestanddelen van Ciprofloxacin Mylan (zie rubriek 6);
- tizanidine inneemt (zie rubriek 2 "Gebruik met andere geneesmiddelen").

Wees extra voorzichtig met Ciprofloxacin Mylan

Wat u moet weten voordat u Ciprofloxacin Mylan krijgt toegediend

Vertel uw arts als u:

- ooit nierproblemen heeft gehad, omdat uw behandeling dan mogelijk moet worden aangepast;
- epilepsie of een andere neurologische aandoening heeft;
- een voorgeschiedenis heeft van peesproblemen bij een eerdere behandeling met antibiotica, zoals Ciprofloxacin Mylan;
- myasthenia gravis (een soort spierzwakte) heeft;
- in het verleden abnormale hartritmen heeft gehad (aritmie).

Terwijl u met Ciprofloxacin Mylan wordt behandeld

*Vertel het meteen aan uw arts als zich één van de volgende situaties voordoet **terwijl u met Ciprofloxacin Mylan wordt behandeld**.* Uw arts zal beslissen of de behandeling met Ciprofloxacin Mylan moet worden stopgezet.

- **een plotselinge ernstige allergische reactie** (een anafylactische reactie/shock, angio-oedeem). Zelfs bij de eerste dosis bestaat een kleine kans dat u een ernstige allergische reactie krijgt met de volgende symptomen: benauwd gevoel in de borstkas, gevoel van duizeligheid, ziekte of flauwte, of duizeligheid bij het rechtop gaan staan. **Als dit gebeurt, vertel het dan meteen uw arts, aangezien de toediening van Ciprofloxacin Mylan zal moeten worden stopgezet;**
- **pijn en zwelling in de gewrichten en peesontsteking** kan soms voorkomen, met name als u ouder bent en ook met corticosteroïden wordt behandeld. Stop bij het eerste teken van enige pijn of ontsteking moet Ciprofloxacin Mylan worden stopgezet en laat de pijnlijke plaats rusten. Vermijd onnodige inspanning, aangezien dit het risico van een peesscheuring kan verhogen;
- als u **epilepsie** of een andere **neurologische aandoening** heeft, zoals cerebrale ischemie of beroerte, kunt u bijwerkingen krijgen die verband houden met het centrale zenuwstelsel. Als dit gebeurt, stop dan met het gebruik van Ciprofloxacin Mylan en *neem onmiddellijk contact op met uw arts;*
- na de eerste toediening van ciprofloxacin, kunt u **psychische reacties** krijgen. Als u een **depressie** of **psychose** heeft, kunnen uw symptomen bij een behandeling met Ciprofloxacin Mylan erger worden. Als dit gebeurt, stop dan met het gebruik van

Ciprofloxacin Mylan en *neem onmiddellijk contact op met uw arts*;

- u kunt symptomen krijgen van neuropathie, zoals pijn, een brandend of tintelend gevoel, gevoelloosheid en/of zwakte. Als dit gebeurt, stop dan met het gebruik van Ciprofloxacin Mylan en *neem onmiddellijk contact op met uw arts*;
- **diarree** kan optreden terwijl u antibiotica gebruikt, dus ook bij Ciprofloxacin Mylan, en zelfs enkele weken nadat u ermee bent gestopt. Als deze ernstig wordt of aanhoudt of als u merkt dat uw ontlasting bloed of slijm bevat, *vertel het dan meteen uw arts*. De behandeling met Ciprofloxacin Mylan moet onmiddellijk worden stopgezet, aangezien dit levensbedreigend kan zijn. Neem geen geneesmiddelen in die de stoelgang kunnen stoppen of vertragen;
- *vertel de arts of het personeel van het laboratorium* dat u Ciprofloxacin Mylan gebruikt als u een **bloed- of urinemonster** moet geven;
- Ciprofloxacin Mylan kan de **lever beschadigen**. Als u symptomen opmerkt, zoals verminderde eetlust, geelzucht (geelverkleuring van de huid), donkere urine, jeuk of drukgevoeligheid van de maag, dan moet de behandeling met Ciprofloxacin Mylan meteen worden stopgezet;
- Ciprofloxacin Mylan kan een daling van het aantal witte bloedlichaampjes veroorzaken en kan uw **weerstand tegen infecties verlagen**. Als u een infectie ervaart met symptomen als koorts en ernstige verslechtering van uw algehele toestand, of koorts met symptomen van een plaatselijke infectie, zoals pijn in uw keel of mond, of als u problemen met plassen krijgt, *dan moet u onmiddellijk bij uw arts langs gaan*. Er wordt wat bloed afgenomen om een mogelijke daling van het aantal witte bloedcellen te controleren (agranulocytose). Het is belangrijk dat u uw arts informeert over het gebruik van dit geneesmiddel;
- *vertel het aan uw arts* als u of iemand in uw familie een tekort aan een bloedenzym met de naam glucose-6-fosfaat dehydrogenase (G6PD) heeft, omdat hierdoor bij gebruik van ciprofloxacin het risico bestaat dat u bloedarmoede krijgt;
- uw huid wordt **gevoeliger voor zonlicht en ultraviolet (UV) licht** wanneer u met Ciprofloxacin Mylan wordt behandeld. Vermijd blootstelling aan sterk zonlicht en kunstmatig UV licht, zoals zonnebanken.

Gebruik met andere geneesmiddelen

Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen.

Gebruik Ciprofloxacin Mylan niet samen met tizanidine, omdat dit bijwerkingen kan veroorzaken zoals een lage bloeddruk en slaperigheid (zie rubriek 2 "**U mag Ciprofloxacin Mylan niet toegediend krijgen als u**").

Van de volgende geneesmiddelen is bekend dat ze in uw lichaam een wisselwerking hebben met Ciprofloxacin Mylan. Wanneer Ciprofloxacin Mylan samen met deze geneesmiddelen wordt gebruikt, kan dat invloed hebben op de werkzaamheid van die geneesmiddelen. Ook de kans op mogelijke bijwerkingen kan groter zijn.

Vertel uw arts als u het volgende inneemt

- warfarine of andere orale anticoagulantia (om het bloed te verdunnen);
- probenecide (voor jicht);
- methotrexaat (voor bepaalde soorten kanker, psoriasis, reumatoïde artritis);
- theofylline (voor ademhalingsproblemen);
- tizanidine (voor spierspasticiteit bij multiple sclerose);
- clozapine (een antipsychoticum);
- ropinirol (voor de ziekte van Parkinson);

- fenytoïne (voor epilepsie).

Ciprofloxacin Mylan kan de concentratie van de volgende geneesmiddelen in uw bloed **verhogen**:

- pentoxifylline (voor bloedcirculatiestoornissen);
- cafeïne.

Gebruik van Ciprofloxacin Mylan met voedsel en drank

Voeding en drank hebben geen invloed op uw behandeling met Ciprofloxacin Mylan.

Zwangerschap en borstvoeding

Het is beter Ciprofloxacin Mylan niet te gebruiken als u zwanger bent. *Vertel uw arts als u van plan bent om zwanger te worden.*

Gebruik Ciprofloxacin Mylan niet terwijl u borstvoeding geeft, omdat ciprofloxacin in de moedermelk wordt uitgescheiden en schadelijk kan zijn voor uw kind.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Ciprofloxacin Mylan kan u minder alert maken. Er kunnen enkele neurologische bijwerkingen optreden. Zorg er dus voor dat u weet hoe u op Ciprofloxacin Mylan reageert voordat u een voertuig bestuurt of een machine bedient. *Raadpleeg bij twijfel uw arts.*

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Ciprofloxacin Mylan

Glucose

Ciprofloxacin Mylan 200 mg/100 ml bevat 5,0 g glucose in 100 ml oplossing voor infusie.

Ciprofloxacin Mylan 400 mg/200 ml bevat 10 g glucose in 200 ml oplossing voor infusie.

Hier moet rekening mee worden gehouden bij patiënten met diabetes mellitus

3. HOE WORDT CIPROFLOXACINE MYLAN GEBRUIKT

Uw arts zal u precies uitleggen hoeveel Ciprofloxacin Mylan u toegediend krijgt en ook hoe vaak en hoelang. Dit is afhankelijk van het type infectie dat u heeft en hoe ernstig die is.

Vertel uw arts als u nierproblemen heeft, omdat uw dosis dan mogelijk moet worden aangepast.

Doorgaans duurt de behandeling 5 tot 21 dagen, maar bij ernstige infecties kan de behandeling langer duren.

Uw arts zal u elke dosis met een langzame infusie via een ader in uw bloedcirculatie toedienen. Voor kinderen duurt de infusie 60 minuten. Bij volwassen patiënten bedraagt de infusietijd 60 minuten voor 400 mg Ciprofloxacin Mylan en 30 minuten voor 200 mg Ciprofloxacin Mylan. Wanneer de infusie langzaam wordt toegediend, helpt dit te voorkomen dat er meteen bijwerkingen optreden.

Denk eraan om voldoende te drinken wanneer u Ciprofloxacin Mylan gebruikt.

Als u stopt met uw kuur Ciprofloxacin Mylan

Het is belangrijk dat u **de behandelingskuur afmaakt**, zelfs als u zich na een paar dagen beter begint te voelen. Als u te snel stopt met het gebruik van dit geneesmiddel, is het mogelijk dat uw infectie niet volledig geneest en dat de symptomen van de infectie terugkeren of verergeren. Bovendien is het mogelijk dat u resistentie tegen het antibioticum ontwikkelt.

Als u nog vragen heeft over het gebruik van dit geneesmiddel, vraag dan uw arts of apotheker.

4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN

Zoals alle geneesmiddelen kan Ciprofloxacin Mylan bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt.

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, *raadpleeg dan uw arts of apotheker*.

Vaak voorkomende bijwerkingen (1 tot 10 op de 100 personen kunnen deze krijgen)

- misselijkheid, diarree, braken;
- gewrichtspijnen bij kinderen;
- lokale reactie op de plaats van injectie, uitslag;
- tijdelijk verhoogde hoeveelheden van bepaalde stoffen in het bloed (transaminasen).

Soms voorkomende bijwerkingen (1 tot 10 op de 1.000 personen kunnen deze krijgen)

- superinfecties met een schimmel;
- een hoge concentratie van eosinofielen, een bepaald type witte bloedcel; verhoogde of verlaagde hoeveelheden van een bloedstollingsfactor (trombocyten);
- verminderde eetlust (anorexia);
- hyperactiviteit of opgewondenheid, verwardheid, desoriëntatie, hallucinaties;
- hoofdpijn, duizeligheid, slaapproblemen of smaakstoornissen, tintelingen, ongewone gevoeligheid voor prikkels van de zintuigen, epileptische aanvallen (zie rubriek 2, Wees extra voorzichtig met Ciprofloxacin Mylan), draaierigheid;
- problemen met het zicht;
- gehoorverlies;
- snelle hartslag (tachycardie);
- verwijding van de bloedvaten (vasodilatatie), lage bloeddruk;
- buikpijn, spijsverteringsproblemen, bijvoorbeeld last van de maag (indigestie/zuurbranden), winderigheid;
- leverstoornissen, verhoogde hoeveelheden van een stof in het bloed (bilirubine), geelzucht (cholestatische icterus);
- jeuk of netelroos;
- gewrichtspijn bij volwassenen;
- slechte nierfunctie, nierfalen;
- pijn in uw spieren en botten, gevoel van onwel zijn (asthenie), koorts, vocht vasthouden;
- verhoogde alkalische fosfatase in het bloed (een bepaalde stof in het bloed).

Zelden voorkomende bijwerkingen (1 tot 10 op de 10.000 personen kunnen deze krijgen)

- ontsteking van de dikke darm (colitis) als gevolg van het gebruik van een antibioticum (kan in zeer zeldzame gevallen fataal zijn) (zie rubriek 2 "Wees extra voorzichtig met Ciprofloxacin Mylan");
- wijzigingen in de bloedwaarden (leukopenie, leukocytose, neutropenie, anemie), een daling van het aantal rode en witte bloedcellen en bloedplaatjes (pancytopenie), wat fataal kan zijn, beenmergdepressie, wat ook fataal kan zijn (zie rubriek 2 "Wees extra voorzichtig met Ciprofloxacin Mylan");
- allergische reactie, allergische zwelling (oedeem), snelle zwelling van de huid en slijmvliezen (angio-oedeem) ernstige allergische reactie (anafylactische shock) die levensbedreigend kan zijn (zie rubriek 2 "Wees extra voorzichtig met Ciprofloxacin Mylan");
- verhoogde bloedsuiker (hyperglykemie);
- angstreactie, vreemde dromen, depressie psychische stoornissen (psychotische reacties) (zie rubriek 2 "Wees extra voorzichtig met Ciprofloxacin Mylan");

- verminderde gevoeligheid van de huid, beven, migraine, tastzin- en reukstoornissen;
- oorsuizingen, verminderd gehoor;
- flauwvallen, ontsteking van de bloedvaten (vasculitis);
- kortademigheid, waaronder astmatische symptomen;
- pancreatitis;
- hepatitis, afsterven van levercellen (levernecrose), zeer af en toe leidend tot een levensbedreigend leverfalen;
- gevoeligheid voor licht (zie rubriek 2 "Wees extra voorzichtig met Ciprofloxacin Mylan"), kleine bloedingen onder de huid ter grootte van een speldenprik (petechiae);
- spierpijn, ontsteking van de gewrichten, verhoogde spierspanning, spierkramp, peesscheuring – vooral van de grote pees aan de achterkant van de enkel (achillespees) (zie rubriek 2 "Wees extra voorzichtig met Ciprofloxacin Mylan");
- bloed of kristallen in de urine, urinewegontsteking (zie rubriek 2 "Wees extra voorzichtig met Ciprofloxacin Mylan");
- overmatig zweten;
- abnormale gehalten van een stollingsfactor (protrombine), verhoogde gehalten van het enzym amylase.

Zeer zelden voorkomende bijwerkingen (minder dan 1 op de 10.000 personen kunnen deze krijgen)

- een bepaalde vorm van gebrek aan rode bloedcellen (hemolytische anemie); een gevaarlijke daling van een type witte bloedcellen (agranulocytose);
- ernstige allergische reacties (anafylactische reacties of anafylactische shock, serumziekte) die fataal kunnen zijn (zie rubriek 2 "Wees extra voorzichtig met Ciprofloxacin Mylan");
- coördinatiestoornis, wankel gang (loopstoornis), druk op de hersenen (intracraniale druk);
- afwijkingen in kleurwaarneming;
- diverse soorten huiduitslag (bijv. het mogelijk fatale syndroom van Stevens-Johnson of toxische epidermale necrolyse);
- spierzwakte, peesontsteking, peesscheuring, verergering van de symptomen van myasthenia gravis (zie rubriek 2 "Wees extra voorzichtig met Ciprofloxacin Mylan").

Frequentie niet bekend (kan niet aan de hand van de beschikbare gegevens worden bepaald)

- problemen die samenhangen met het zenuwstelsel, zoals pijn, een brandend gevoel, tintelingen, een doof gevoel en/of zwakte in de armen of benen;
- ernstige hartritme-afwijkingen, onregelmatige hartslag (Torsades de Pointes).

5. HOE BEWAART U CIPROFLOXACINE MYLAN

Bewaren beneden 25°C.

Bewaren in de buitenste verpakking ter bescherming tegen licht.

Niet in de koelkast of vriezer bewaren.

De geopende zak dient onmiddellijk gebruikt te worden.

Het is aangetoond dat dit geneesmiddel tijdens gebruik chemisch en fysisch stabiel is gedurende 48 uur bij 25°C.

Vanuit microbiologisch oogpunt dient dit geneesmiddel onmiddellijk te worden gebruikt. Indien het niet onmiddellijk gebruikt wordt, zijn de bewaartijden gedurende gebruik en de condities voor gebruik voor de verantwoordelijkheid van de gebruiker.

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Gebruik Ciprofloxacin Mylan niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de verpakking achter "Exp.:" of "Niet te gebruiken na:". De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand.

Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.

6. AANVULLENDE INFORMATIE

Wat bevat Ciprofloxacin Mylan

Het werkzame bestanddeel is Ciprofloxacin.
Elke 100 ml-zak bevat 200 mg ciprofloxacin.
Elke 200 ml-zak bevat 400 mg ciprofloxacin.

De andere bestanddelen zijn melkzuur (E270), glucose monohydraat, zoutzuur (E507) voor het aanpassen van de pH, water voor injecties.

Hoe ziet Ciprofloxacin Mylan er uit en wat is de inhoud van de verpakking

Oplossing voor infusie.

Ciprofloxacin Mylan is een steriele, heldere en kleurloze tot enigszins gele oplossing voor infusie.

Het wordt verpakt in een polyolefin zak, beschermd door zowel een polypropyleen als een ondoorzichtige verpakking.

Verpakkingsgrootten:

Ciprofloxacin Mylan 200 mg/100 ml

1, 10, 20, 30 zakken (ook verkrijgbaar met een geïntegreerd infusieset).

Ciprofloxacin Mylan 400 mg/200 ml

1, 10, 15, 20 zakken (ook verkrijgbaar met een geïntegreerd infusieset).

Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Registratiehouder

Mylan B.V.
Dieselweg 25
3752 LB Bunschoten

Fabrikant vrijgifte

Maco Production S.A.S. – rue Lorthiois, 59420 Mouvaux – Frankrijk
Mylan S.A.S – 117 allée des Parcs, 69800 Saint-Priest – Frankrijk

In het register ingeschreven onder:

RVG 102414 - Ciprofloxacin Mylan 200 mg/100 ml

RVG 102417 - Ciprofloxacin Mylan 400 mg/200 ml

Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen:

Oostenrijk	Ciprofloxacin Arcana 200 mg/100 ml - Infusionslösung Ciprofloxacin Arcana 400 mg/200 ml - Infusionslösung
België	Ciprofloxylin 200 mg/100 ml oplossing voor infusie Ciprofloxylin 400 mg/200 ml oplossing voor infusie
Denemarken	Ciprinomyl, 2 mg/ml solution for infusion
Griekenland	Ciprofloxacin / Generics 200 mg/100 ml solution for infusion Ciprofloxacin / Generics 400 mg/200 ml solution for infusion

Finland	Ciprinomyl, 2 mg/ml solution for infusion
Ierland	Ciprofloxacin, 200 mg/100 ml, solution for infusion Ciprofloxacin, 400 mg/200 ml, solution for infusion
Italië	Ciprofloxacin Mylan Generics Italia
Nederland	Ciprofloxacin Mylan 200 mg / 100 ml, oplossing voor intraveneuze infusie 2 mg/ml Ciprofloxacin Mylan 400 mg / 200 ml, oplossing voor intraveneuze infusie 2 mg/ml
Noorwegen	Ciprinomyl, 2 mg/ml solution for infusion
Zweden	Ciprinomyl, 2 mg/ml solution for infusion
Verenigd Koninkrijk	Ciprofloxacin, 200 mg/100 ml, solution for infusion Ciprofloxacin, 400 mg/200 ml, solution for infusion

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in september 2009

Advies/medische voorlichting

Antibiotica worden gebruikt voor het genezen van bacteriële infecties. Ze werken niet tegen virale infecties. Als uw arts aan u antibiotica heeft voorgeschreven, dan heeft u die inderdaad nodig voor uw huidige ziekte. Ondanks antibiotica kunnen sommige bacteriën toch overleven of groeien. Dit fenomeen wordt resistentie genoemd: sommige behandelingen met antibiotica zijn niet meer effectief.

Door een verkeerd gebruik van antibiotica neemt de weerstand toe. U kunt zelfs aan het resistent worden van bacteriën bijdragen en daardoor uw herstel vertragen of de werkzaamheid van de antibiotica verminderen als u de instructies van uw arts niet opvolgt, voor wat betreft:

- de hoeveelheid antibiotica die u moet gebruiken;
- hoe vaak u het geneesmiddel in moet nemen;
- hoe lang u het geneesmiddel in moet nemen.

Dus om de werkzaamheid van dit geneesmiddel te behouden:

- gebruik alleen antibiotica wanneer deze aan u worden voorgeschreven;
- volg de voorschriften van het recept strikt op;
- gebruik de antibiotica niet opnieuw zonder medisch voorschrift, zelfs niet als u een zelfde ziekte wilt bestrijden;
- geef uw antibioticum nooit door aan iemand anders; het is mogelijk niet geschikt voor diens ziekte;
- breng na het voltooien van de behandeling alle niet gebruikte geneesmiddelen terug naar de apotheek om er zeker van te zijn dat ze op de juiste manier worden weggegooid.

De volgende informatie is alleen bestemd voor artsen of andere beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg:

Ciprofloxacin Mylan moet met een intraveneuze infusie worden toegediend. Voor kinderen duurt de infusie 60 minuten. Bij volwassen patiënten bedraagt de infusietijd 60 minuten voor 400 mg Ciprofloxacin Mylan en 30 minuten voor 200 mg Ciprofloxacin Mylan. Een langzame infusie in een grote ader zal het ongemak voor de patiënt tot een minimum beperken en zal het risico van veneuze irritatie verminderen. De oplossing voor infusie kan rechtstreeks of na mengen met andere verenigbare oplossingen voor infusie met een infusie worden toegediend.

Tenzij de verenigbaarheid met andere oplossingen voor infusie/geneesmiddelen bevestigd is, moet de oplossing voor infusie altijd afzonderlijk worden toegediend. De visuele tekenen van onverenigbaarheid zijn bv. precipitatie, troebelheid en verkleuring.

Onverenigbaarheid treedt op met alle oplossingen voor infusie/geneesmiddelen die fysiek of

chemisch instabiel zijn bij de pH van de oplossing (bv. penicillinen, heparineoplossingen), met name bij de combinatie met oplossingen die aangepast zijn aan een alkalische pH (pH van de oplossingen voor infusie met ciprofloxacin: 3,5-4,6).

Een intraveneuze begonnen behandeling, kan ook oraal worden voortgezet