

–

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER

CREON®150 mg, maagsapresistente capsules Pancreatine

Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het innemen van dit geneesmiddel.

- Bewaar deze bijsluiter. Het kan nodig zijn om deze nog eens door te lezen.
- Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
- Dit geneesmiddel is aan u persoonlijk voorgeschreven. Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen. Dit geneesmiddel kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als de verschijnselen dezelfde zijn als waarvoor u het geneesmiddel heeft gekregen.
- Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

In deze bijsluiter:

1. Wat is Creon en waarvoor wordt het gebruikt
2. Wat u moet weten voordat u Creon inneemt
3. Hoe wordt Creon ingenomen
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Creon
6. Aanvullende informatie

1. WAT IS CREON EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT

Creon is een geneesmiddel ter behandeling van een tekort aan de enzymen van de alvleesklier. Het bevat de spijsverteringsenzymen van de alvleesklier in de vorm van microkorrels, die beschermd zijn tegen de invloed van het maagsap. Deze microkorrels zorgen voor een gelijkmatige verdeling over de maaginhoud, zonder dat de enzymen als gevolg van maagzuur afgebroken worden. In de dunne darm lost, doordat het daar minder zuur is, de laag van de microkorrels op en komen de enzymen vrij zodat zij hun werking kunnen doen.

Creon wordt gebruikt:

bij een onvoldoende werking van de alvleesklier bij kinderen en volwassenen.

Ziekten met onvoldoende werking van de alvleesklier, waarbij Creon aanbevolen wordt zijn bijvoorbeeld:

- cystische fibrose (mucoviscidosis = taaislijmziekte)
- ontsteking van de alvleesklier (pancreatitis)
- toestand na het operatief verwijderen van de alvleesklier (pancreatectomie) of een gedeelte hiervan
- toestand na het operatief verwijderen van de maag (gastrectomie) of een gedeelte hiervan.

2. WAT U MOET WETEN VOORDAT U CREON INNEEMT

Gebruik Creon niet wanneer u

- allergisch (overgevoelig) bent voor varkenseiwitten
- allergisch (overgevoelig) bent voor één van de andere bestanddelen van Creon.

Gebruik met andere geneesmiddelen

Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt krijgen.

Een effect van Creon op andere geneesmiddelen of van andere geneesmiddelen op Creon is niet bekend, met uitzondering van zuurremmende middelen die een gunstig effect kunnen hebben.

Zwangerschap en borstvoeding

Creon mag gebruikt worden tijdens de zwangerschap indien noodzakelijk en op advies van uw arts.

Het gebruik van Creon tijdens het geven van borstvoeding is toegestaan.

Vraag uw arts of apotheker altijd om advies voordat u een geneesmiddel inneemt tijdens zwangerschap en borstvoeding.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Creon heeft, voor zover bekend, geen invloed op het rijgedrag of op het bedienen van machines.

3. HOE WORDT CREON GEBRUIKT

Hoe moet ik Creon gebruiken.

Volg bij het innemen van Creon nauwgezet het advies van uw arts. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker.

Creon capsules worden ingeslikt.

Neem de capsules tijdens de maaltijd in met wat vloeistof (bij voorkeur water; geen vloeistof die warmer is dan 35°C). Slik de capsules door zonder te kauwen. Voor kleine kinderen die de capsule in z'n geheel nog niet kunnen slikken, kan de capsule worden opengemaakt en alleen de microkorrels worden ingenomen. Om het innemen te vergemakkelijken kan de inhoud worden uitgestrooid op een koud of lauw brijachtig voedingsmiddel.

Kauw de microkorrels niet en druk ze niet plat, omdat anders de beschermende laag van de microkorrels kan beschadigen. Het verdient aanbeveling met water of lauwe thee na te spoelen.

Hoeveel Creon moet ik gebruiken

De gebruikelijke dosering is 1 capsule per hoofdmaaltijd. Aanpassing van de dosering dient te gebeuren op geleide van uw toestand, de vetinname (vetbelasting) en de vetuitscheiding in de ontlasting. De uiteindelijke dosering hangt af van de mate waarin de alvleesklier nog functioneert. Bij een sterk verminderde werking van de alvleesklier kan uw arts u enkele capsules per maaltijd voorschrijven. Het dagelijks maximum is afhankelijk van uw lichaamsgewicht.

Als u merkt dat Creon te sterk of juist te weinig werkt, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Wat u moet doen als u meer van Creon heeft ingenomen dan u zou mogen

Drink een ruime hoeveelheid water. Neem altijd contact op met uw arts om te horen of een behandeling nodig is als teveel Creon is ingenomen. Neem altijd de verpakking mee; de arts kan dan meteen zien om welk geneesmiddel het gaat.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Creon in te nemen

Wanneer u bent vergeten Creon in te nemen, wacht dan tot de volgende maaltijd. Neem niet meer dan de gewone hoeveelheid capsules in.

Neem geen dubbele dosis om een vergeten capsule in te halen.

Als u nog vragen heeft over het innemen van dit geneesmiddel, vraag dan uw arts of apotheker.

4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN

Zoals alle geneesmiddelen kan Creon bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt.

Bijwerkingen kunnen:

zeer vaak voorkomen (bij meer dan 1 op de 10 patiënten);
vaak voorkomen (bij meer dan 1 op de 100, maar bij minder dan 1 op de 10 patiënten);
soms voorkomen (bij meer dan 1 op de 1.000, maar bij minder dan 1 op de 100 patiënten);
zelden voorkomen (bij meer dan 1 op de 10.000, maar bij minder dan 1 op de 1.000 patiënten);
zeer zelden voorkomen (bij minder dan 1 op de 10.000 patiënten).

Maagdarmstelselaandoeningen

Vaak: buikpijn, opgezette buik, diarree, verstopping, abnormale stoelgang, misselijkheid, braken

Huid- en onderhuidaandoeningen

Soms: allergische of overgevoeligheidsreacties van de huid

Onbekend: jeuk, netelroos

Neem bij buikklachten onmiddellijk contact op met uw huisarts.

Wanneer één van deze bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

5. HOE BEWAART U CREON

- Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.
- Bewaren beneden 30 °C in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen vocht en sluit het potje goed af na gebruik. Na openen niet bewaren boven 25 °C en binnen 3 maanden gebruiken.
- Gebruik Creon niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op het potje na EXP. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand.

Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.

6. AANVULLENDE INFORMATIE

Wat bevat Creon

- **Het werkzaam bestanddeel is** pancreatine, 150 mg per maagsapresistente capsule, overeenkomend met 10.000 eenheden lipase 8.000 eenheden amylase, en 600 eenheden protease volgens de Europese Farmacopee.
- **De andere bestanddelen (hulpstoffen) zijn:** capsule-inhoud (microkorrels): macrogol 4000, cetylalcohol, hypromelloseftalaat, triethyl citraat en dimeticon 1000
capsulewand: gelatine, ijzeroxide rood (E 172), ijzeroxide geel (E172), ijzeroxide zwart (E172), titaniumdioxide (E 171) en natriumlaurylsulfaat

(Zie ook rubriek 2a “gebruik Creon niet”)

Hoe ziet Creon er uit en wat is de inhoud van de verpakking

Creon is een capsule met gereguleerde afgifte. De ene helft van de capsule is oranje, de andere helft is doorzichtig.

Creon wordt geleverd in HDPE potjes met 100 capsules.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Vergunninghouder:

Abbott B.V.
Wegalaan 9
2132 JD Hoofddorp
Tel 088 8222 688

Fabrikant:

Abbott Products BV, Neustadt, Duitsland.

Creon 150 mg is in het register ingeschreven onder RVG 10656

Heeft u nog vragen?

Raadpleeg uw arts of apotheker als u nog meer vragen hebt over het gebruik van dit geneesmiddel.
Zij beschikken over uitgebreide medische informatie van Creon.

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in december 2011