

Centrafarm Pharmaceuticals B.V., Etten-Leur, The Netherlands		
<b>Inderm, applicatievloeistof 1%</b>		RVG 14095
Erytromycine 10 mg/g		

## Naam produkt en farmaceutische vorm

# INDERM, applicatievloeistof 1%

## Registratiehouder

Centrafarm Pharmaceuticals B.V., NL-4879 AC Etten-Leur

## Fabrikant

Daiichi Sankyo Europe GmbH, Luitpoldstrasse 1, 85276 Pfaffenhofen, Duitsland

*of*

Mobilat Produktions GmbH, Luitpoldstrasse 1, 85276 Pfaffenhofen, Duitsland

*of*

STADA Arzneimittel AG, Stadastrasse 2-18, 61118 Bad Vilbel, Duitsland

## Samenstelling

Oplossing van 1 % erytromycine in alcohol (propanol-2).

1 g vloeistof bevat 10 mg erytromycine base.

## Werking

Inderm is bestemd voor de behandeling van matige tot ernstige vormen van acne waarbij andere lokale therapieën onvoldoende resultaat hebben opgeleverd.

Inderm bevat erytromycine, dat behoort tot de zg. antibiotica, stoffen die bacteriën doden of in hun groei remmen.

Toegediend in de alcoholische Inderm-oplossing dringt erytromycine door in de afvoergangen van de talgklieren en remt daar de groei van de bacteriën die verantwoordelijk zijn voor de ontstekingen bij acne. Hoe snel de verbetering intreedt kan nogal verschillen en hangt bijv. af van de ernst van de acne. De behandeling moet daarom minstens 6 weken worden volgehouden. De ervaring leert dat toepassing gedurende 8 weken meestal afdoende is. (zie ook: „Hoe gebruiken en hoeveel”).

## Voordat het geneesmiddel gebruikt wordt

Als U bij eerder gebruik van Inderm of andere erytromycine-bevattende preparaten overgevoelighedsreacties hebt gehad moet U dit geneesmiddel niet gebruiken. Ook als U overgevoelig bent voor andere lotions of antibiotica doet U er verstandig aan raad te vragen aan uw arts of apotheker voor U de behandeling begint.

## Bijwerkingen en eventuele problemen die kunnen optreden

Vooral aan het begin van de behandeling kan de alcohol in de oplossing een voorbijgaand branderig gevoel, roodheid, afschilfering van de huid of jeuk veroorzaken. U dient dan het aantal toepassingen te verminderen. Als U zeer heftig reageert moet U de behandeling stopzetten.

--	--	--	--	--	--

Centrafarm Pharmaceuticals B.V., Etten-Leur, The Netherlands		
<b>Inderm</b> , applicatievloeistof 1%		RVG 14095
Erytromycine 10 mg/g		

### Zwangerschap en borstvoeding

Inderm kan, voor zover bekend zonder gevaar voor de vrucht of de zuigeling, overeenkomstig het voorschrift worden gebruikt door vrouwen die zwanger zijn of borstvoeding geven.

### Rijvaardigheid

Op theoretische gronden is van dit geneesmiddel geen invloed te verwachten op de rijvaardigheid of de bekwaamheid om machines te gebruiken en in de praktijk is een dergelijke invloed ook nooit gemeld.

### Waarop verder te letten

Gelijktijdig gebruik van middelen die afschilfering van de huid veroorzaken vergroot de kans op huidirritatie.

Omdat Inderm alcohol bevat moet U het niet met slijmvliezen, open wonden of de ogen in aanraking brengen.

De oplossing is ontvlambaar.

### Hoe gebruiken en hoeveel:

's Morgens en 's avonds de aangedane huid reinigen en met Inderm bevochtigen. Houdt de huid steeds goed schoon, maar overdrijf het niet. Acne wil niet zeggen dat de huid vuil is. Door te vaak wassen gaan de talgklieren harder werken, waardoor de acne kan verergeren. De lotion aanbrengen met een wattenpropje, tissue of iets dergelijks.

Zoals gezegd duurt een behandeling 6 tot 8 weken, maar als U na 4 weken nog geen of onvoldoende verbetering ziet moet U uw arts raadplegen. Het kan dan zijn dat de bacteriën ongevoelig zijn geworden en met verdere behandeling met Inderm moet dan 2 maanden worden gewacht.

### Hoe bewaren?

Bewaar Inderm in de originele verpakking, bij kamertemperatuur. De vervaldatum wordt voorafgegaan door „niet te gebruiken na:" en is als volgt aangeduid: maand (1 t/m 12) jaar (laatste 2 cijfers jaartal).

### Verpakking

Flacon van 50 ml.

### RVG-nummer

Inderm is in het register ingeschreven onder nummer RVG 14095

**Datum waarop de bijsluiter voor het laatst is herzien: februari 2010**

--	--	--	--	--	--