


29 JUL 2005

SUCRALFAAT SANDOZ® SUSPENSIE 1

Patiënteninformatie:

Naam van het geneesmiddel:
Sucralfaat Sandoz suspensie 1



Wat zit er in Sucralfaat Sandoz suspensie 1?

Sucralfaat Sandoz suspensie 1 bevat het werkzame bestanddeel sucralfaathydraat. 5 Gram suspensie bevat sucralfaathydraat overeenkomend met 1 gram sucralfaat. Het bevat bovendien de volgende conserveringsmiddelen: chloorhexidine-acetaat, methyl-4-hydroxybenzoaat en propyl-4-hydroxybenzoaat. De overige bestanddelen zijn aluminiumchloride, glycerol, sorbitol, natriumcycламаat, xanthaan, natriumcitraat en water.

Hoe ziet Sucralfaat Sandoz suspensie 1 eruit?

Sucralfaat Sandoz suspensie 1 is een geneesmiddel in de vorm van een suspensie. Het is verkrijgbaar in zakjes van 5 g. Elk zakje bevat 1 g sucralfaat.

Hoe werkt Sucralfaat Sandoz suspensie 1?

Sucralfaat Sandoz suspensie 1 is een geneesmiddel dat behoort tot de groep van anti-ulcuspreparaten. Dit zijn geneesmiddelen voor het behandelen van o.a. maagzweren.

Naam van het bedrijf dat verantwoordelijk is voor het in de handel brengen:

Sandoz B.V.

Voor inlichtingen en correspondentie

Sandoz B.V.

Postbus 10332

1301 AH Almere

Registratienummer:

In het register ingeschreven onder RVG 16859.

Wanneer wordt Sucralfaat Sandoz suspensie 1 voorgeschreven?

Sucralfaat Sandoz suspensie 1 wordt voorgeschreven voor het behandelen van klachten die veroorzaakt worden door zweren van de twaalfvingerige darm, maagzweren en een ontsteking van het slokdarmslijmvlies (deze is ontstaan ten gevolge van terugvloeiing van maagsap).

Sucralfaat Sandoz suspensie 1 wordt tevens voorgeschreven om te voorkomen dat zweren van de twaalfvingerige darm en maagzweren opnieuw optreden.

Voordat u het geneesmiddel gaat gebruiken

Wanneer mag u Sucralfaat Sandoz suspensie 1 niet gebruiken?

U mag Sucralfaat Sandoz suspensie 1 niet gebruiken wanneer de werking van uw nieren ernstig gestoord is. Bovendien mag u Sucralfaat Sandoz suspensie 1 niet gebruiken wanneer gebleken is dat u overgevoelig bent voor chloorhexidine of parabenen.

Kunt u Sucralfaat Sandoz suspensie 1 samen met andere geneesmiddelen gebruiken?

Wanneer Sucralfaat Sandoz suspensie 1 in combinatie wordt gebruikt, dan kan de opname van sommige andere middelen worden verminderd.

Het gaat hierbij o.a. om de volgende geneesmiddelen: tetracyclines (antibiotica), fenytoïnes (middelen gebruikt bij epilepsie, hartritmerelgelaars), sulpirides (middelen gebruikt bij geestesziekte), digoxines (hartversterkers), ursodesoxycholzuur (galzuur) of chenodesoxycholzuur (galzuur). H₂-receptorantagonisten (onder andere gebruikt als maagzuurremmers), norfloxacines (antibiotica) en andere quinolonen (antibiotica), furosemides (water-afdrijvende middelen) en theophyllines (geneesmiddelen gebruikt bij krampen van de bronchusspierwand, hartmiddelen, water afdrijvende middelen). Sucralfaat Sandoz suspensie 1 mag niet gelijktijdig met deze geneesmiddelen worden ingenomen. Deze andere middelen moeten 1 à 2 uur vóór Sucralfaat Sandoz suspensie 1 worden ingenomen.

Het gebruik van Sucralfaat Sandoz suspensie 1 bij zwangerschap en het geven van borstvoeding

Over het gebruik van sucralfaat in de zwangerschap en tijdens de periode van borstvoeding bestaan onvoldoende gegevens om de mogelijke schadelijkheid te beoordelen. Er zijn tot dusver geen aanwijzingen voor schadelijkheid bij dierproeven.

Bij zwangerschap en tijdens de periode van borstvoeding dient u eerst uw arts te raadplegen.

Het gebruik van Sucralfaat Sandoz suspensie 1 en autorijden of het bedienen van machines

Er zijn geen gegevens bekend over het effect van dit product op de rijvaardigheid. Een effect is niet waarschijnlijk.

Hoeveel Sucralfaat Sandoz suspensie 1 moet u innemen en wanneer?

Als acute therapie bij zweer van de twaalfvingerige en maagzweren wordt aanbevolen telkens 1 g sucralfaat (= 1 zakje Sucralfaat Sandoz suspensie 1) 4 keer dagelijks te weten een half uur voor de maaltijden en de vierde dosis vlak voor het slapen gaan in te nemen. De duur van de therapie bedraagt over het algemeen 4 – 8 weken, zonodig tot 12 weken.

Om te voorkomen dat zweren aan de twaalfvingerige darm weer terugkeren wordt 2 x daags 1 g sucralfaat (1 zakje) 's morgens vóór het ontbijt en 's avonds vóór het slapen gaan ingenomen.

Een ontsteking van het onderste slokdarmgedeelte door terugvloeiing van maagsap (reflux-oesofagitis) kan met 4 keer 1 g sucralfaat (= 4 keer 1 zakje Sucralfaat Sandoz suspensie 1) na de maaltijden en vóór het slapen gaan worden voorkomen

Niet langer dan 14 dagen gebruiken zonder een arts te raadplegen.

Sucralfaat Sandoz suspensie 1 bevat de kunstmatige zoetstof cyclamaat. Deze zoetstof mag niet langdurig worden gebruikt, tenzij na overleg met de arts.

Wat moet u doen als u te veel Sucralfaat Sandoz suspensie 1 heeft ingenomen?

Als te veel sucralfaat is ingenomen, dan dient een arts worden geraadpleegd.

Een grote overdosering kan worden behandeld met een maagspoeling.

Wat moet u doen als u vergeten bent Sucralfaat Sandoz suspensie 1 in te nemen?

U kunt de volgende keer gewoon doorgaan met de behandeling met Sucralfaat Sandoz suspensie 1 wanneer u vergeten bent om een maatlepeltje in te nemen.

De vergeten dosis moet worden overgeslagen.

Wat gebeurt er als u de behandeling met Sucralfaat suspensie Guilini plotseling staakt?
Mocht u de behandeling onderbreken of voortijdig staken, dan kunnen de klachten weer terugkomen.

Welke bijwerkingen kunnen er optreden bij het gebruik van Sucralfaat Sandoz suspensie 1?

Soms kan men na het innemen van Sucralfaat Sandoz suspensie 1 last krijgen van verstopping.

Als u last krijgt van bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan vermeld, dan dient u een arts of apotheker te raadplegen.

Hoe moet u Sucralfaat Sandoz suspensie 1 bewaren en hoe lang?

Sucralfaat Sandoz suspensie 1 moet bij kamertemperatuur (15 – 25°C) worden bewaard. Een aangebroken zakje moet op dezelfde dag worden opgemaakt.

De uiterste gebruiksdatum staat op de verpakking vermeld na “EXP” of “Niet te gebruiken na”. Als deze datum is verstreken, dan mag het product niet meer worden gebruikt.

Bewaar geneesmiddelen altijd buiten het bereik van kinderen.

Datum waarop deze bijsluiter voor het laatst is herzien:

Maart 2005

Sandoz en het beeldelement zijn geregistreerde handelsmerken van Novartis