


PART IB2

Sucralfaat 1 PCH (granulaat in sachets)

PHARMACHEMIE B.V. - HAARLEM



ALGEMENE KENMERKEN

Naam van het geneesmiddel
Sucralfaat 1 PCH

Samenstelling
1 Gram sucralfaat overeenkomend met 190 mg aluminium per sachet.
Hulpstoffen: natriumzetmeelglycollaat, hydroxypropylcellulose.

Farmaceutische vorm en inhoud
Granulaat in sachet à 1 g.

Geneesmiddelen groep
Sucralfaat behoort tot de groep der mucosa-protectiva. Deze middelen vormen een beschermende laag, indien het slijmvlies van de slokdarm, de maag of de twaalfvingerige darm is beschadigd door de (verdere) inwerking van maagzuur.

Naam van degene die verantwoordelijk is voor het in de handel brengen
Pharmachemie B.V.
Postbus 552
2003 RN Haarlem

In het register ingeschreven onder
RVG 17346.

GEBRUIKEN BIJ
- maagdarmszweren, voorkoming van maagdarmszweren
- slokdarmontstekingen.

VOORDAT U HET GENEESMIDDEL GEBRUIKT

Niet gebruiken bij
- overgevoeligheid voor sucralfaat of één van de andere bestanddelen van het granulaat
- een ernstig gestoorde nierfunctie, omdat het aluminiumgehalte in het bloed kan stijgen.

Nodige voorzorgen bij gebruik

Gebruik tijdens zwangerschap en het geven van borstvoeding
Bij zwangerschap en het geven van borstvoeding alleen gebruiken na overleg met uw arts.

Invloed op de rijvaardigheid en de bekwaamheid om machines te gebruiken
Er zijn geen gegevens bekend over de invloed van dit produkt op de rijvaardigheid en de bekwaamheid om machines te gebruiken. Een effect is echter niet waarschijnlijk.

PART IB2Wisselwerking

Een wisselwerking wil zeggen dat geneesmiddelen bij gelijktijdig gebruik elkaars werking en/of bijwerking kunnen beïnvloeden.

Een wisselwerking kan optreden bij gelijktijdig gebruik van dit geneesmiddel met:

- bepaalde geneesmiddelen tegen maagdarmzweren (zoals bijv. cimetidine)
- bepaalde antibiotica (o.a. tetracycline)
- fenytoïne (middel tegen epilepsie)
- furosemide (plasmiddel)
- sulpiride (middel tegen ernstige geestesziekten of duizeligheid)
- theofylline (middel tegen CARA)
- chenodeoxycholzuur en ursodesoxycholzuur (middelen tegen galstenen)
- middelen die de stolling van het bloed vertragen (anticoagulantia).

Wanneer u zulke of andere geneesmiddelen gebruikt, moet u hiermee rekening houden en advies vragen aan uw arts of apotheker.

Waarschuwingen en voorzorgen

Bij de behandeling van een maagzweer dient uw arts u regelmatig te controleren.

Indien de klachten aanhouden, veranderen of terugkeren dient u uw arts te raadplegen.

AANWIJZINGEN VOOR HET GEBRUIKDosering en wijze van gebruik

De inhoud van een sachet in een glas water doen en omroeren.

De aanbevolen dosering is als volgt:

MAAGDARMZWEREN:

4 keer per dag (=24 uur) 1 sachet, ongeveer een half uur voor de maaltijd en vlak voor het slapen gaan.

TER VOORKOMING VAN MAAGDARMZWEREN:

2 keer per dag (=24 uur) 1 sachet, 's morgens voor het ontbijt en 's avonds voor het slapen gaan.

SLOKDARMONTSTEKINGEN:

4 keer per dag (=24 uur) 1 sachet, na de maaltijd en voor het slapen gaan.

Overdosering

Een dosering van 12 keer per dag 4 sachets (4 gram) sucralfaat leidt niet tot bijwerkingen. Indien u meer dan de voorgeschreven dosering heeft ingenomen, dient u uw arts te raadplegen.

Gevolgen bij het vergeten van een dosis of bij het plotseling stoppen met het geneesmiddel

Wanneer u een dosis vergeet of plotseling stopt met het gebruik van dit geneesmiddel kunnen de verschijnselen die voor het begin van de behandeling bestonden weer optreden.

Wanneer u een dosis gemist hebt, neem dan zo snel mogelijk deze dosis alsnog in. Als het echter bijna tijd is voor de volgende dosis, sla dan de gemiste dosis over en ga verder met uw normale doseringsschema. Neem geen dubbele doseringen.

BIJWERKINGEN

Soms komt verstopping voor.

Waarschuw uw arts of apotheker wanneer u last ondervindt van één van bovengenoemde bijwerkingen of indien bij u een bijwerking optreedt die niet wordt vermeld in de bijsluiters.

PART IB2

BEWARING EN HOUDBAARHEID

Droog en bij kamertemperatuur (15 tot 25 °C) bewaren in de goed gesloten verpakking. Op deze wijze bewaard kunt u dit geneesmiddel gebruiken tot de op de verpakking vermelde datum. De aanduiding "Exp." op de verpakking betekent: "niet te gebruiken na".

Geneesmiddelen altijd buiten bereik van kinderen bewaren.

Februari 1999

0199.4v.FvdL
0299.5v.RK