

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER

Aciclovir Sandoz® koortslipcrème, crème 50 mg/g aciclovir

Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u.

Dit geneesmiddel kan zonder voorschrift verkregen worden. Desondanks moet u Aciclovir Sandoz koortslipcrème zorgvuldig gebruiken om een goed resultaat te bereiken.

- Bewaar deze bijsluiter. Het kan nodig zijn om deze nog eens door te lezen.
- Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
- Raadpleeg een arts, als uw verschijnselen verergeren of niet verbeteren na 10 dagen.
- Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

In deze bijsluiter

1. Wat is Aciclovir Sandoz koortslipcrème en waarvoor wordt het gebruikt?
2. Wat u moet weten voordat u Aciclovir Sandoz koortslipcrème gebruikt.
3. Hoe wordt Aciclovir Sandoz koortslipcrème gebruikt?
4. Mogelijke bijwerkingen.
5. Hoe bewaart u Aciclovir Sandoz koortslipcrème?
6. Aanvullende informatie.

1. WAT IS ACICLOVIR SANDOZ KOORTSLIPCRÈME EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT?

De naam van dit geneesmiddel is Aciclovir Sandoz koortslipcrème. Dit middel behoort tot een groep geneesmiddelen voor de behandeling van infecties veroorzaakt door een virus.

Aciclovir Sandoz koortslipcrème wordt gebruikt voor de behandeling van een koortslip veroorzaakt door het Herpes simplex virus.

2. WAT U MOET WETEN VOORDAT U ACICLOVIR SANDOZ KOORTSLIPCRÈME GEBRUIKT.

Gebruik Aciclovir Sandoz koortslipcrème niet als u allergisch (overgevoelig) bent voor:

- aciclovir of één van de andere stoffen die in dit geneesmiddel zitten (zie rubriek 6).

Als één van het bovenstaande op u van toepassing is, gebruik dit geneesmiddel dan niet. Als u hier niet zeker over bent, neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u Aciclovir Sandoz gebruikt.

Wees extra voorzichtig met Aciclovir Sandoz koortslipcrème

- Als u problemen heeft die uw immuunsysteem kunnen verzwakken, moet u met uw arts overleggen voordat u Aciclovir Sandoz koortslipcrème gebruikt.
- Aciclovir Sandoz koortslipcrème kan de sterkte en veiligheid van latex condooms verminderen.

Gebruik met andere geneesmiddelen

Het is niet bekend hoe de crème andere geneesmiddelen beïnvloedt die u op de huid gebruikt.

Zwangerschap en borstvoeding

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel gebruikt als u zwanger bent of borstvoeding geeft.

- Tijdens de zwangerschap kunt u gedurende een korte periode Aciclovir Sandoz koortslipcrème gebruiken. Het risico van aciclovir gebruik op de huid tijdens de zwangerschap is onbekend, maar lijkt klein te zijn. Er zijn geen nadelige effecten voor het ongeboren kind gevonden bij gebruik van aciclovir tabletten.
- Tijdens het geven van borstvoeding kunt u Aciclovir Sandoz koortslipcrème blijven gebruiken. Uit onderzoek met aciclovir tabletten blijkt dat aciclovir overgaat in de moedermelk. Na plaatselijke behandeling met Aciclovir Sandoz koortslipcrème was in de moedermelk geen aciclovir terug te vinden.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Het is niet waarschijnlijk dat dit geneesmiddel de rijvaardigheid of de bekwaamheid om machines te bedienen beïnvloedt. U moet echter wachten tot u weet hoe u op Aciclovir Sandoz koortslipcrème reageert voordat u met deze activiteiten begint.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Aciclovir Sandoz koortslipcrème

- Propyleenglycol kan huidirritatie veroorzaken
- Cetylalcohol kan plaatselijke huidreacties veroorzaken (bijv. contact dermatitis).

3. HOE WORDT ACICLOVIR SANDOZ KOORTSLIPCRÈME GEBRUIKT?

Volg bij het gebruik van Aciclovir Sandoz koortslipcrème nauwgezet het advies van uw arts. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker.

Volwassenen en kinderen

- start met het gebruiken van de crème wanneer u de eerste tekenen van infectie krijgt. U kunt blaasjes op de huid zien of het tintelende gevoel waarnemen, wat betekent dat het blaasje spoedig zal ontstaan.
- strijk overdag om de vier uur een dunne laag crème op het aangetaste gebied en het omliggende oppervlak. Dit is gewoonlijk ongeveer 5 keer per dag.
- Het is het beste om een wattenstokje te gebruiken om de crème aan te brengen. Wanneer u de crème met uw vingers aanbrengt moet u vóór en na het aanbrengen uw handen grondig wassen. Op deze manier voorkomt u dat het virus zich naar nog niet besmette gebieden verspreidt en om nieuwe infecties van de beschadigde huid te voorkomen (bijv. met bacteriën).
- Gebruik Aciclovir Sandoz koortslipcrème gedurende vijf dagen. Als het blaasje na vijf dagen nog niet volledig genezen is, moet u de crème nog vijf extra dagen gebruiken. **Als het blaasje na tien dagen nog niet genezen is, stop dan met het gebruik van de crème en vertel het uw arts.**
- Zorg ervoor dat u de crème niet in uw ogen krijgt.
- Gebruik de crème niet in uw mond of vagina. Het kan de huid in deze gebieden irriteren.

Wat u moet doen als u meer van Aciclovir Sandoz koortslipcrème heeft gebruikt dan u zou mogen

Wanneer u meer van Aciclovir Sandoz koortslipcrème heeft gebruikt dan zou mogen, neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Wat u moet doen als u Aciclovir Sandoz koortslipcrème heeft ingeslikt

Het inslikken van de crème is waarschijnlijk niet schadelijk. Echter, neem contact op met uw arts of apotheker als u zich onzeker voelt of als u na het inslikken van de crème bijwerkingen krijgt.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Aciclovir Sandoz koortslipcrème te gebruiken

- Als u de crème vergeten bent te gebruiken, ga door met de behandeling zodra u dit ontdekt.
- Gebruik niet meer crème om te compenseren voor de tijd die u vergeten bent om de crème te gebruiken.

Als u nog vragen heeft over het gebruik van dit geneesmiddel, vraag dan uw arts of apotheker.

4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN.

Zoals alle geneesmiddelen kan Aciclovir Sandoz koortslipcrème bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt.

Ernstige allergische reacties (treden zeer zelden op bij minder dan 1 op de 10.000 mensen)

Als u een allergische reactie heeft, **stop dan onmiddellijk met het gebruik van dit middel en neem direct contact op met uw arts.**

De verschijnselen zijn:

- zwelling van uw gezicht, lippen, tong, of andere delen van uw lichaam
- kortademigheid, piepende ademhaling of moeilijk ademen.

Andere bijwerkingen

Soms voorkomende bijwerkingen (treden op bij minder dan 1 op de 100 mensen):

- een branderig of stekend gevoel na het aanbrengen van de crème
- een iets droge of schilferende huid
- jeuk.

Zelden voorkomende bijwerkingen (treden op bij minder dan 1 op de 1.000 mensen)

- roodheid van de huid
- huiduitslag.

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

5. HOE BEWAART U ACICLOVIR SANDOZ KOORTSLIPCRÈME?

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Gebruik Aciclovir Sandoz koortslipcrème niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de verpakking na "Niet te gebruiken na:" of "Exp.:". De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand.

Gebruik de crème niet langer dan één maand na het openen van de tube.

Bewaren beneden 25°C. Niet in de koelkast of vriezer bewaren.

Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.

6. AANVULLENDE INFORMATIE.

Wat bevat Aciclovir Sandoz koortslipcrème

- Aciclovir Sandoz koortslipcrème bevat 50 mg aciclovir per gram crème.
- Het werkzame bestanddeel is aciclovir.
- De overige bestanddelen zijn: propyleenglycol, vaseline, vloeibare paraffine, cetylalcohol, dimeticon, glycerylmonostearaat, polyoxyethyleen-30-stearaat en gezuiverd water.

Hoe ziet Aciclovir Sandoz koortslipcrème eruit en wat is de inhoud van de verpakking?

Aciclovir Sandoz koortslipcrème is een witte tot gebroken witte, homogene crème. De verpakking bestaat uit een aluminium tube van 2g met HPDE dop.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Sandoz B.V., Veluwezoom 22, Almere, Nederland
Correspondentie: Postbus 10332, 1301 AH Almere

Registratienummer

RVG 20659

Dit geneesmiddel is geregistreerd in de lidstaten van de EEA onder de volgende namen:

Nederland: Aciclovir Sandoz koortslipcrème
Portugal: Milavir crème

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in augustus 2011.