

## **PATIËNTENBIJSLUITER**

Lees deze bijsluiters steeds vóór het gebruik van dit geneesmiddel. Ook indien u reeds eerder Aciclovir ratiopharm 30 mg/g, oogzalf hebt gebruikt. De informatie in deze bijsluiters kan door nieuwe bevindingen of veranderde inzichten zijn gewijzigd, indien u een volgende verpakking krijgt.

## **ALGEMENE KENMERKEN**

### **Naam van het geneesmiddel**

Aciclovir ratiopharm 30 mg/g, oogzalf.

### **Samenstelling**

Aciclovir ratiopharm 30 mg/g, oogzalf bevat per gram: 30 mg aciclovir en 970 mg witte vaseline. De zalf is steriel en bevat geen conserveermiddelen.

### **Farmaceutische vorm en inhoud**

Oogzalf.

Tube met 4,5 g zalf.

### **Werking**

Aciclovir remt de groei van het Herpes simplex- en van Varicella zoster virussen.

### **Naam van degene die verantwoordelijk is voor het in de handel brengen**

ratiopharm Nederland bv

Florapark 4

2012 HK Haarlem

Nederland

### **In het register ingeschreven onder:**

RVG 22447 - Aciclovir ratiopharm 30 mg/g, oogzalf.

## **TOEPASSING VAN HET GENEESMIDDEL**

Aciclovir ratiopharm 30 mg/g, oogzalf is bestemd voor de behandeling van hoornvliesontsteking veroorzaakt door het Herpes simplex-virus.

## **VOORDAT HET GENEESMIDDEL GEBRUIKT WORDT**

### **Niet gebruiken bij**

- een gebleken overgevoeligheid voor aciclovir.

### **Nodige voorzorgen bij gebruik**

*Gebruik tijdens zwangerschap en borstvoeding:*

Tijdens de zwangerschap en het geven van borstvoeding slechts gebruiken na overleg met uw arts.

*Invloed op de rijvaardigheid en het vermogen om machines te gebruiken:*

Na het aanbrengen van de oogzalf kan door wazig zien uw gezichtsvermogen tijdelijk zijn verminderd.

#### **Wisselwerking met andere geneesmiddelen**

Aciclovir ratiopharm 30 mg/g, oogzalf soms met bepaalde geneesmiddelen wisselwerkingen vertonen (dit betekent dat ze elkaars (bij)werking(en) kunnen beïnvloeden). Meld daarom altijd aan uw arts welke andere geneesmiddelen u (af en toe) gebruikt.

Bij plaatselijke toediening van dit produkt zijn geen wisselwerkingen met andere geneesmiddelen bekend.

#### **Speciale waarschuwingen en voorzorgen**

Aciclovir ratiopharm 30 mg/g, oogzalf is uitsluitend bestemd voor toediening in het oog.

### **AANWIJZINGEN VOOR HET GEBRUIK**

#### **Dosering**

Uw arts zal een persoonlijke, aan uw klachten aangepaste, dosering voorschrijven.

Aciclovir ratiopharm 30 mg/g, oogzalf dient vijf maal per dag met tussenpozen van ongeveer 4 uur te worden aangebracht in de onderste oogzak.

De behandeling dient tenminste tot 3 dagen, nadat uw arts u volledig genezen heeft verklaard te worden voortgezet.

#### **Wijze van gebruik**

1 cm van de zalf in de onderste oogzak aanbrengen.

#### **Verschijnselen bij en behandeling van overdosering**

Bij een (vermoede) overdosering dient u direct een arts te waarschuwen.

Kenmerkende verschijnselen van een overdosering met aciclovir zijn niet bekend.

#### **Wat te doen als een dosis vergeten is**

Indien u vergeten bent de zalf in het oog aan te brengen, moet u dit alsnog doen.

Als de tijd die er verstreken is tussen de vergeten dosering echter langer is dan de tijd tot de volgende dosering, dan kunt u beter wachten tot de volgende dosering. Op dat moment moet u dan de zalf weer gewoon aanbrengen en de behandeling volgens voorschrift van uw arts voortzetten.

### **BIJWERKINGEN EN EVENTUELE PROBLEMEN DIE KUNNEN OPTREDEN**

Raadpleeg altijd uw arts of apotheker indien bij u een bijwerking optreedt die **niet** wordt vermeld in deze bijsluiter of die ernstig is. De volgende bijwerkingen kunnen onder andere optreden:

- een tijdelijk, licht stekend gevoel in het oog direct na toediening
- plaatselijke irritaties en ontstekingsreacties
- oppervlakkige beschadiging van het hoornvlies.

### **AANWIJZINGEN VOOR HET BEWAREN**

Droog, niet boven 25°C bewaren. Niet in een koelkast bewaren of invriezen. In de originele verpakking bewaren. Op deze wijze bewaard kunt u dit geneesmiddel gebruiken tot en met de op de verpakking achter 'EXP' vermelde datum.  
Na openen is de tube nog slechts 1 maand houdbaar.

**Geneesmiddelen altijd buiten het bereik van kinderen bewaren!**

#### **ALGEMENE WENKEN**

Het is mogelijk dat na het lezen van de bovenstaande tekst nog vragen resteren. U kunt daarmee terecht bij uw arts of apotheker. Zij beschikken over de laatste informatie.

**Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in november 2010**