

## BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER

### Aciclovir Sandoz 30 mg/g, oogzalf aciclovir

**Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel.**

- Bewaar deze bijsluiter. Het kan nodig zijn om deze nog eens door te lezen.
- Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
- Dit geneesmiddel is aan u persoonlijk voorgeschreven. Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen. Dit geneesmiddel kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als de verschijnselen dezelfde zijn als waarvoor u het geneesmiddel heeft gekregen.
- Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

In deze bijsluiter:

1. Wat is Aciclovir Sandoz oogzalf en waarvoor wordt het gebruikt?
2. Wat u moet weten voordat u Aciclovir Sandoz oogzalf gebruikt.
3. Hoe wordt Aciclovir Sandoz oogzalf gebruikt?
4. Mogelijke bijwerkingen.
5. Hoe bewaart u Aciclovir Sandoz oogzalf?
6. Aanvullende informatie.

### 1. WAT IS ACICLOVIR SANDOZ OOGZALF EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT?

Aciclovir Sandoz 30 mg/g behoort tot de groep van zogenaamde antivirale middelen. Het remt de werking van het in Herpes en Varicella virussen voorkomende enzym DNA-polymerase, waardoor deze virussen zich niet kunnen vermenigvuldigen.

Aciclovir Sandoz 30 mg/g, oogzalf is bestemd voor de behandeling van herpes simplex infecties van het hoornvlies van het oog (herpes keratitis).

### 2. WAT U MOET WETEN VOORDAT U ACICLOVIR SANDOZ OOGZALF GEBRUIKT.

#### Gebruik Aciclovir Sandoz oogzalf niet

als u allergisch (overgevoelig) bent voor aciclovir, valaciclovir of voor één van de andere bestanddelen van Aciclovir Sandoz oogzalf.

#### Wees extra voorzichtig met Aciclovir Sandoz oogzalf

Aciclovir Sandoz 30 mg/g, oogzalf is uitsluitend bestemd voor toediening in het oog. Direct na het aanbrengen van de oogzalf kan een licht stekend gevoel van voorbijgaande aard voorkomen. Ondanks het vaak hevig prikkende gevoel bij herpes keratitis, is wrijven in het oog sterk te ontraden. Het oppervlak van het hoornvlies is door de herpesinfectie beschadigd. Wrijven verergert dit en remt de genezing.

#### Gebruik met andere geneesmiddelen

Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen.

Er zijn geen wisselwerkingen bekend tussen Aciclovir Sandoz 30 mg/g, oogzalf en andere geneesmiddelen.

#### Zwangerschap en borstvoeding

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel gebruikt.

Er zijn geen schadelijke effecten te verwachten van Aciclovir Sandoz 30 mg/g, oogzalf. Indien Aciclovir Sandoz 30 mg/g, oogzalf langdurig wordt gebruikt, dient bij zwangerschap en borstvoeding overleg met de arts te worden gepleegd.

### **Rijvaardigheid en het gebruik van machines**

Door de aanwezigheid van de zalf op het oog kan het voorkomen dat u na het aanbrengen kortstondig minder scherp kunt zien. Het is niet te verwachten dat dit geneesmiddel de rijvaardigheid of de bekwaamheid om machines te bedienen zal beïnvloeden.

### **3. HOE WORDT ACICLOVIR SANDOZ OOGZALF GEBRUIKT?**

Volg bij het gebruik van Aciclovir Sandoz 30 mg/g, oogzalf nauwgezet het advies van uw arts. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker.

Raadpleeg de op het etiket vermelde, voor u bestemde, aanwijzingen. De gebruikelijke dosering is als volgt:

Volwassenen en kinderen:

5 maal daags, met tussenpozen van ongeveer 4 uur, dient u 1 cm zalf aan te brengen in het onderste ooglid. `s Nachts hoeft de oogzalf niet te worden aangebracht.

#### **Hoe moet u Aciclovir Sandoz oogzalf aanbrengen?**

- Was voor elke toediening uw handen
- Laat u eventueel door een ander helpen
- Draai het dopje van de tube,
- Trek het onderooglid met een vinger omlaag,
- Laat door een lichte druk op de tube 1 cm zalf in de ruimte tussen het ooglid en het oog vallen,
- Knipper een aantal keren langzaam met uw oogleden om de zalf te verspreiden,
- Sluit hierna direct de tube met de dop.

U kunt het beste voor een spiegel gaan staan om de oogzalf aan te brengen. Houd bij het aanbrengen van de oogzalf de tube langs het oog met de punt in de richting van de neus. Laat de punt van de tube nooit in contact komen met uw oog of huid, om besmetting te voorkomen.

Voorstel voor tijdstippen om Aciclovir Sandoz 30 mg/g, oogzalf aan te brengen: 7:00 uur, 11:00 uur, 15:00 uur, 19:00 uur en 23:00 uur.

Voor een optimaal resultaat dient Aciclovir Sandoz 30 mg/g, oogzalf in een zo vroeg mogelijk stadium van de aandoening te worden aangebracht zodat beschadiging van het hoornvlies door het virus kan worden beperkt of zelfs voorkomen.

#### **Wat u moet doen als u meer van Aciclovir Sandoz oogzalf heeft gebruikt dan u zou mogen**

Er zijn geen gevallen van overdosering bekend. Na het doorslikken van de volledige inhoud van de tube zijn geen ongewenste effecten te verwachten.

#### **Als u stopt met het gebruik van Aciclovir Sandoz oogzalf**

De behandeling met Aciclovir Sandoz 30 mg/g, oogzalf dient tenminste tot drie dagen na volledige genezing te worden voortgezet, ter voorkoming van het opnieuw opvlammen van de ontsteking. Volg nauwkeurig de aanwijzingen van uw arts op over de behandelingsduur.

Neem altijd contact op met uw arts als u voortijdig wilt stoppen met het gebruik van dit geneesmiddel; de oorspronkelijke klachten kunnen weer terugkeren.

Als u nog vragen heeft over het gebruik van dit geneesmiddel, vraag dan uw arts of apotheker.

#### **4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN.**

Zoals alle geneesmiddelen kan Aciclovir Sandoz 30 mg/g, oogzalf bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt.

Mogelijke bijwerkingen zijn hier gerangschikt naar frequentie:

Zeer vaak (bij meer dan 1 op de 10 personen)

Vaak (bij meer dan 1 op de 100 en bij minder dan 1 op de 10 personen)

Zelden (bij meer dan 1 op de 10.000 en minder dan 1 op de 1.000 personen)

Zeer zelden (bij minder dan 1 op de 10.000 personen)

##### Oogaandoeningen

*Zeer vaak:*

Afwijking aan het hoornvlies. Dit heeft echter geen invloed op de behandeling.

*Vaak:*

Na het aanbrengen van de zalf kan men last krijgen van voorbijgaande milde prikkeling van het oog. Ook kan bindvliesontsteking voorkomen.

*Zelden:*

Een ontsteking aan de ooglidranden.

##### Immuunsysteemaandoeningen

*Zeer zelden:*

Overgevoeligheidsreactie waarbij plotselinge vochtophoping op kan treden (angioedeem).

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

#### **5. HOE BEWAART U ACICLOVIR SANDOZ OOGZALF?**

Bewaren beneden 25°C. Niet in de koelkast of vriezer bewaren.

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Gebruik Aciclovir Sandoz 30 mg/g, oogzalf niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de verpakking na "Niet te gebruiken na" of "Exp". De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand.

Na opening van de tube is Aciclovir Sandoz 30 mg/g oogzalf 1 maand houdbaar.

Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.

#### **6. AANVULLENDE INFORMATIE.**

##### **Wat bevat Aciclovir Sandoz oogzalf**

- Het werkzame bestanddeel is: aciclovir. Eén gram oogzalf bevat 30 mg aciclovir.
- Het andere bestanddeel is: witte vaseline.

##### **Hoe ziet Aciclovir Sandoz oogzalf er uit en wat is de inhoud van de verpakking**

De oogzalf is wit tot lichtgeel van kleur. Verpakkingen Aciclovir Sandoz 30 mg/g bevatten 4,5 gram oogzalf in een tube.

## **Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant**

### **Registratiehouder**

Sandoz B.V.  
Postbus 10332  
1301 AH Almere

### **Fabrikant**

HEXAL A/S  
Kanalholmen 8-12  
2650 Hvidovre  
Denemarken

Sandoz B.V.  
Postbus 10332  
1301 AH Almere

### **Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen**

Aciclovir Sandoz 30 mg/g, oogzalf, is in het register ingeschreven onder RVG 22569.

### **Deze bijsluiter is het laatst herzien in oktober 2008**

Sandoz en het beeldelement zijn geregistreerde handelsmerken van Novartis.

---