

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER

Ciprofloxacin Mylan 250 en 500 mg, filmomhulde tabletten

Ciprofloxacin

Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het innemen van dit geneesmiddel.

- Bewaar deze bijsluiter. Het kan nodig zijn om deze nog eens door te lezen.
- Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
- Dit geneesmiddel is aan u persoonlijk voorgeschreven. Geef het niet door aan anderen. Dit geneesmiddel kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als de verschijnselen dezelfde zijn als waarvoor u het geneesmiddel heeft gekregen.
- Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

In deze bijsluiter:

1. Wat is Ciprofloxacin Mylan en waarvoor wordt het gebruikt
2. Wat u moet weten voordat u Ciprofloxacin Mylan inneemt
3. Hoe wordt Ciprofloxacin Mylan ingenomen
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Ciprofloxacin Mylan
6. Aanvullende informatie

1. Wat is Ciprofloxacin Mylan en waarvoor wordt het gebruikt

Ciprofloxacin Mylan is een antibioticum dat tot de fluorochinolonfamilie behoort. Het werkzame bestanddeel is ciprofloxacin. Ciprofloxacin werkt door bacteriën te doden die infecties veroorzaken. Het werkt alleen bij specifieke bacteriestammen.

Volwassenen

Ciprofloxacin Mylan wordt bij volwassenen gebruikt om de volgende bacteriële infecties te behandelen:

- luchtweginfecties;
- langdurige of terugkerende oor- of bijholte-infecties;
- urineweginfecties;
- infecties van de testikels;
- infecties van de geslachtsorganen bij vrouwen;
- infecties van het maag-darmstelsel en infecties in de buikholte;
- infecties van huid en weke delen;
- infecties van bot en gewrichten;
- behandeling van infecties bij patiënten met een zeer laag aantal witte bloedcellen (neutropenie);
- voorkomen van infecties bij patiënten met een zeer laag aantal witte bloedcellen (neutropenie);
- om infecties te voorkomen als gevolg van de bacterie *Neisseria meningitidis*;
- blootstelling aan antrax door inademing.

Als u een ernstige infectie heeft of een infectie heeft die door meer dan één type bacterie is veroorzaakt, krijgt u mogelijk behalve Ciprofloxacin Mylan ook nog een aanvullende behandeling met antibiotica.

Kinderen en jongeren

Ciprofloxacin Mylan wordt bij kinderen en jongeren onder medisch toezicht van een specialist gebruikt om de volgende bacteriële infecties te behandelen:

- long- en bronchusinfecties bij kinderen en jongeren die aan cystische fibrose lijden;
- gecompliceerde urineweginfecties, waaronder infecties die de nieren hebben bereikt (pyelonefritis);

- blootstelling aan antrax door inademing.

Ciprofloxacin Mylan kan ook gebruikt worden om bepaalde andere ernstige infecties bij kinderen en jongeren te behandelen als uw arts dit noodzakelijk acht.

2. Wat u moet weten voordat u Ciprofloxacin Mylan inneemt

Neem Ciprofloxacin Mylan niet in

- wanneer u allergisch (overgevoelig) bent voor het werkzame bestanddeel of voor andere chinolon-geneesmiddelen of voor één van de andere bestanddelen van Ciprofloxacin Mylan (zie rubriek 6);
- wanneer u tizanidine gebruikt (zie rubriek 2 “Inname met andere geneesmiddelen”).

Wees extra voorzichtig met Ciprofloxacin Mylan

Voordat u Ciprofloxacin Mylan inneemt

Hartproblemen

U moet voorzichtig zijn met het gebruik van dit type middel als u geboren bent met een verlengd QT-interval of dit in uw familie voorkomt (vastgesteld met een ECG, een hartfilmpje), u een onevenwichtige zoutbalans in het bloed heeft (in het bijzonder een laag gehalte aan kalium of magnesium in het bloed), als u een hele trage hartslag heeft (dit heet “bradycardie”), als u een zwak hart heeft (hartfalen), als u een hartaanval heeft gehad (myocardinfarct), als u vrouw bent of als u al op leeftijd bent of als u andere medicijnen gebruikt die leiden tot veranderingen in het ECG (zie rubriek “Gebruik met andere geneesmiddelen”).

Vertel uw arts wanneer u:

- ooit nierproblemen heeft gehad omdat uw behandeling dan mogelijk moet worden aangepast;
- epilepsie of een andere neurologische aandoening heeft;
- een voorgeschiedenis heeft van peesproblemen bij een eerdere behandeling met antibiotica, zoals Ciprofloxacin Mylan;
- myasthenia gravis (een soort spierzwakte) heeft;
- in het verleden abnormale hartritmen heeft gehad (aritmie).

Terwijl u Ciprofloxacin Mylan inneemt

Vertel het meteen aan uw arts als zich één van de volgende situaties voordoet **terwijl u Ciprofloxacin Mylan inneemt**. Uw arts zal beslissen of de behandeling met Ciprofloxacin Mylan moet worden stopgezet.

- **een plotselinge ernstige allergische reactie** (een anafylactische reactie/shock, angio-oedeem). Zelfs bij de eerste dosis bestaat een kleine kans dat u een ernstige allergische reactie krijgt met de volgende symptomen: benauwd gevoel in de borstkas, gevoel van duizeligheid, ziekte of flauwte, of duizeligheid bij het rechtop gaan staan. Als dit gebeurt, stop dan met het innemen van Ciprofloxacin Mylan en neem onmiddellijk contact op met uw arts;
- **pijn en zwelling in de gewrichten en peesontsteking** kan soms voorkomen, met name als u ouder bent en ook met corticosteroiden wordt behandeld. Stop bij het eerste teken van enige pijn of ontsteking met het innemen van Ciprofloxacin Mylan en laat de pijnlijke plaats rusten. Vermijd onnodige inspanning, aangezien dit het risico van een peesscheuring kan verhogen;
- als u **epilepsie** of een andere **neurologische aandoening** heeft, zoals cerebrale ischemie of beroerte, kunt u bijwerkingen krijgen die verband houden met het centrale zenuwstelsel. Als dit gebeurt, stop dan met het innemen van Ciprofloxacin Mylan en neem onmiddellijk contact op met uw arts;
- de eerste keer dat u Ciprofloxacin Mylan inneemt, kunt u **psychische reacties** krijgen. Als u een **depressie** of **psychose** heeft, kunnen uw symptomen bij een behandeling met Ciprofloxacin Mylan erger worden. Als dit gebeurt, stop dan met het innemen van Ciprofloxacin Mylan en neem onmiddellijk contact op met uw arts;
- u kunt symptomen krijgen van neuropathie, zoals pijn, een brandend of tintelend gevoel,

gevoelloosheid of zwakte. Als dit gebeurt, stop dan met het innemen van Ciprofloxacin Mylan en neem onmiddellijk contact op met uw arts;

- **diarree** kan optreden terwijl u antibiotica inneemt, dus ook bij Ciprofloxacin Mylan, en zelfs enkele weken nadat u ermee bent gestopt. Als deze ernstig wordt of aanhoudt of als u merkt dat uw ontlasting bloed of slijm bevat, stop dan meteen met het innemen van Ciprofloxacin Mylan, aangezien dit levensbedreigend kan zijn. Neem geen geneesmiddelen in die de stoelgang kunnen stoppen of vertragen en raadpleeg uw arts;
- vertel de arts of het personeel van het laboratorium dat u Ciprofloxacin Mylan inneemt als u een **bloed- of urinemonster** moet geven;
- Ciprofloxacin Mylan kan de **lever beschadigen**. Als u symptomen opmerkt, zoals verminderde eetlust, geelzucht (geelverkleuring van de huid), donkere urine, jeuk of drukgevoeligheid van de maag, stop dan met het innemen van Ciprofloxacin Mylan en raadpleeg meteen uw arts;
- Ciprofloxacin Mylan kan een daling van het aantal witte bloedlichaampjes veroorzaken en kan uw **weerstand tegen infecties verlagen**. Als u een infectie ervaart met symptomen als koorts en ernstige verslechtering van uw algehele toestand, of koorts met symptomen van een plaatselijke infectie, zoals pijn in uw keel of mond, of als u problemen met plassen krijgt, dan moet u onmiddellijk bij uw arts langs gaan. Er wordt wat bloed afgenomen om een mogelijke daling van het aantal witte bloedcellen te controleren (agranulocytose). Het is belangrijk dat u uw arts informeert over het gebruik van dit geneesmiddel;
- vertel het aan uw arts als u of iemand in uw familie een tekort aan een bloedenzym met de naam glucose-6-fosfaat dehydrogenase (G6PD) heeft, omdat hierdoor bij gebruik van ciprofloxacin het risico bestaat dat u bloedarmoede krijgt;
- uw huid wordt **gevoeliger voor zonlicht en ultraviolet (UV) licht** wanneer u Ciprofloxacin Mylan inneemt. Vermijd blootstelling aan sterk zonlicht en kunstmatig UV licht, zoals zonnebanken.

Gebruik met andere geneesmiddelen

Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen.

Vertel het uw arts als u geneesmiddelen gebruikt die uw hartritme kunnen veranderen: geneesmiddelen van de groep anti-aritmica (bijv. kinidine, hydrokinidine, disopyramide, amiodaron, sotalol, dofetilide en ibutilide), tricyclische antidepressiva, bepaalde antibiotica (van de groep de macroliden) en bepaalde antipsychotica

Neem Ciprofloxacin Mylan niet samen met tizanidine in, omdat dit bijwerkingen kan veroorzaken zoals een lage bloeddruk en slaperigheid (zie rubriek 2 “Neem Ciprofloxacin Mylan niet in”).

Van de volgende geneesmiddelen is bekend dat ze in uw lichaam een wisselwerking hebben met Ciprofloxacin Mylan. Wanneer Ciprofloxacin Mylan samen met deze geneesmiddelen wordt ingenomen, kan dat invloed hebben op de werkzaamheid van die geneesmiddelen. Ook de kans op mogelijke bijwerkingen kan groter zijn.

Vertel uw arts als u het volgende inneemt

- warfarine of andere orale anticoagulantia (om het bloed te verdunnen);
- probenecide (voor jicht);
- methotrexaat (voor bepaalde soorten kanker, psoriasis, reumatoïde artritis);
- theofylline (voor ademhalingsproblemen);
- tizanidine (voor spierspasticiteit bij multiple sclerose);
- clozapine (een antipsychoticum);
- ropinirol (voor de ziekte van Parkinson);
- fenytoïne (voor epilepsie).

Ciprofloxacin Mylan kan de concentratie van de volgende geneesmiddelen in uw bloed **verhogen**:

- pentoxifylline (voor bloedcirculatiestoornissen);
- cafeïne.

Sommige geneesmiddelen **verminderen** het effect van Ciprofloxacin Mylan. Vertel uw arts als u het volgende inneemt of in wilt nemen:

- maagzuurbindende middelen (antacida);
- mineraalsupplementen;
- sucralfaat;
- een polymere fosfaatbinder (bijv. sevelameer);
- geneesmiddelen of supplementen die calcium, magnesium, aluminium of ijzer bevatten.

Als deze middelen van wezenlijk belang zijn, neem Ciprofloxacin Mylan dan ongeveer twee uur voor of ten minste vier uur na inname van deze middelen in.

Gebruik van Ciprofloxacin Mylan met voedsel en drank

Tenzij u Ciprofloxacin Mylan bij de maaltijden inneemt, mag u geen zuivelproducten (zoals melk of yoghurt) eten of drinken en ook geen dranken nuttigen waaraan calcium is toegevoegd wanneer u de tabletten inneemt, omdat deze invloed kunnen hebben op de absorptie van het werkzame bestanddeel.

Zwangerschap en borstvoeding

Het is beter Ciprofloxacin Mylan niet te gebruiken als u zwanger bent. Vertel uw arts als u van plan bent om zwanger te worden.

Neem Ciprofloxacin Mylan niet in terwijl u borstvoeding geeft, omdat ciprofloxacin in de moedermelk wordt uitgescheiden en schadelijk kan zijn voor uw kind.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Ciprofloxacin Mylan kan u minder alert maken. Er kunnen enkele neurologische bijwerkingen optreden. Zorg er dus voor dat u weet hoe u op Ciprofloxacin Mylan reageert voordat u een voertuig bestuurt of een machine bedient. Raadpleeg bij twijfel uw arts.

3. Hoe wordt Ciprofloxacin Mylan ingenomen

Uw arts zal u precies uitleggen hoeveel Ciprofloxacin Mylan u moet innemen en ook hoe vaak en hoelang. Dit is afhankelijk van het type infectie dat u heeft en hoe ernstig die is.

Vertel uw arts als u nierproblemen heeft, omdat uw dosis dan mogelijk moet worden aangepast.

Doorgaans duurt de behandeling 5 tot 21 dagen, maar bij ernstige infecties kan de behandeling langer duren. Volg bij het innemen van de tabletten nauwgezet het advies van uw arts. Vraag het aan uw arts of apotheker als u niet zeker weet hoeveel tabletten u moet innemen en hoe u Ciprofloxacin Mylan moet innemen.

- Slik de tabletten met voldoende vloeistof in. Kauw niet op de tabletten, omdat ze niet lekker smaken.
- Probeer wel de tabletten elke dag op ongeveer hetzelfde tijdstip in te nemen.
- U kunt de tabletten bij of tussen de maaltijden innemen. Calcium als onderdeel van een maaltijd zal geen grote invloed hebben op de opname. Neem Ciprofloxacin Mylan tabletten echter **niet** met zuivelproducten in, zoals melk of yoghurt, of met verrijkte vruchtensappen (bijv. met calcium verrijkt sinaasappelsap).

Denk eraan om voldoende te drinken wanneer u Ciprofloxacin Mylan inneemt.

Wat u moet doen wanneer u meer van Ciprofloxacin Mylan heeft ingenomen dan u zou mogen
Wanneer u meer dan de voorgeschreven dosis heeft ingenomen, raadpleeg dan meteen een arts. Indien mogelijk, neem dan uw tabletten of de doos mee om aan de arts te laten zien.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Ciprofloxacin Mylan in te nemen

Neem de normale dosis zo snel mogelijk in en zet de behandeling dan voort volgens het voorschrift. Als het echter bijna tijd is voor uw volgende dosis, neem dan de overgeslagen dosis niet in en zet de behandeling voort zoals gebruikelijk. Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Zorg ervoor dat u uw behandeling afmaakt.

Als u stopt met het innemen van Ciprofloxacin Mylan

Het is belangrijk dat u **de behandelingskuur afmaakt**, zelfs als u zich na een paar dagen beter begint te voelen. Als u te snel stopt met het innemen van dit geneesmiddel, is het mogelijk dat uw infectie niet volledig geneest en dat de symptomen van de infectie terugkeren of verergeren. Bovendien is het mogelijk dat u resistentie tegen het antibioticum ontwikkelt.

Als u nog vragen heeft over het gebruik van dit geneesmiddel, vraag dan uw arts of apotheker.

4. Mogelijke bijwerkingen

Zoals alle geneesmiddelen kan Ciprofloxacin Mylan bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt.

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Vaak voorkomende bijwerkingen (1 tot 10 op de 100 personen kunnen deze krijgen)

- misselijkheid, diarree;
- gewrichtspijnen bij kinderen.

Soms voorkomende bijwerkingen (1 tot 10 op de 1.000 personen kunnen deze krijgen)

- superinfecties met een schimmel;
- een hoge concentratie van eosinofielen, een bepaald type witte bloedcel;
- verminderde eetlust (anorexia);
- hyperactiviteit of opgewondenheid;
- hoofdpijn, duizeligheid, slaapproblemen of smaakstoornissen;
- braken, buikpijn, spijsverteringsproblemen bijvoorbeeld last van de maag (indigestie/zuurbranden) of winderigheid;
- verhoogde hoeveelheden van bepaalde stoffen in het bloed (transaminasen en/of bilirubine);
- uitslag, jeuk of netelroos;
- gewrichtspijn bij volwassenen;
- slechte nierfunctie;
- pijn in uw spieren en botten, gevoel van onwel zijn (asthenie) of koorts;
- verhoogde alkalische fosfatase in het bloed (een bepaalde stof in het bloed).

Zelden voorkomende bijwerkingen (1 tot 10 op de 10.000 personen kunnen deze krijgen)

- ontsteking van de dikke darm (colitis) als gevolg van het gebruik van een antibioticum (kan in zeer zeldzame gevallen fataal zijn) (zie rubriek 2 “Wees extra voorzichtig met Ciprofloxacin Mylan”);
- wijzigingen in de bloedwaarden (leukopenie, leukocytose, neutropenie, anemie), verhoogde of verlaagde hoeveelheden van een bloedstollingsfactor (trombocyten);
- allergische reactie, zwelling (oedeem) of snelle zwelling van de huid en slijmvliezen (angio-oedeem);
- verhoogde bloedsuiker (hyperglykemie);
- verwardheid, desoriëntatie, angstreacties, vreemde dromen, depressie of hallucinaties;
- spelden- en naaldenprikgevoel, ongewone gevoeligheid voor prikkels van de zintuigen, verminderde gevoeligheid van de huid, beven, epileptische aanvallen (zie rubriek 2 “Wees extra voorzichtig met Ciprofloxacin Mylan”) of draaierigheid;
- problemen met het zicht;
- oorsuizingen, gehoorverlies, gehoorstoornis;
- snelle hartslag (tachycardie);
- verwijding van de bloedvaten (vasodilatatie), lage bloeddruk of flauwvallen;
- kortademigheid, waaronder astmatische symptomen;
- leverstoornissen, geelzucht (cholestatische icterus) of hepatitis;

- gevoeligheid voor licht (zie rubriek 2 “Wees extra voorzichtig met Ciprofloxacin Mylan”);
- spierpijn, ontsteking van de gewrichten, verhoogde spierspanning of spierkramp;
- nierfalen, bloed of kristallen in de urine (zie rubriek 2 “Wees extra voorzichtig met Ciprofloxacin Mylan”), urinewegontsteking;
- vocht vasthouden of overmatig zweten;
- abnormale gehalten van een stollingsfactor (protrombine) of verhoogde gehalten van het enzym amylase.

Zeer zelden voorkomende bijwerkingen (minder dan 1 op de 10.000 personen kunnen deze krijgen)

- een bepaalde vorm van gebrek aan rode bloedcellen (hemolytische anemie); een gevaarlijke daling van een type witte bloedcellen (agranulocytose); een daling van het aantal rode en witte bloedcellen en bloedplaatjes (pancytopenie) die fataal kan zijn, en beenmergdepressie die ook fataal kan zijn (zie rubriek 2 “Wees extra voorzichtig met Ciprofloxacin Mylan”);
- ernstige allergische reacties (anafylactische reactie of anafylactische shock die fataal kan zijn - serumziekte) (zie rubriek 2 “Wees extra voorzichtig met Ciprofloxacin Mylan”);
- mentale stoornissen (psychotische reacties) (zie rubriek 2 “Wees extra voorzichtig met Ciprofloxacin Mylan”);
- migraine, coördinatiestoornis, wankele gang (loopstoornis), tast- of reukstoornis; druk op de hersenen (intracraniale druk);
- afwijkingen in kleurwaarneming;
- ontsteking van de wand van de bloedvaten (vasculitis);
- pancreatitis;
- afsterven van levercellen (levernecrose), zeer zelden leidend tot een levensbedreigend leverfalen;
- kleine bloedingen onder de huid ter grootte van een speldenprik (petechiae); diverse soorten huiduitslag (bijvoorbeeld het mogelijk fatale syndroom van Stevens-Johnson of toxische epidermale necrolyse);
- spierzwakte, peesontsteking, peesscheuring - met name van de grote pees aan de achterkant van de enkel (achillespees); verergering van de symptomen van myasthenia gravis (zie rubriek 2 “Wees extra voorzichtig met Ciprofloxacin Mylan”).

Frequentie niet bekend (kan niet aan de hand van de beschikbare gegevens worden bepaald)

- problemen die samenhangen met het zenuwstelsel, zoals pijn, een brandend gevoel, tintelingen, een doof gevoel en/of zwakte in de armen of benen;
- abnormaal snelle hartslag, levensbedreigende onregelmatige hartslag, verandering van het hartritme (dit heet “verlenging van het QT-interval” en wordt vastgesteld met een ECG, een hartfilmpje).

5. Hoe bewaart u Ciprofloxacin Mylan

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Gebruik Ciprofloxacin Mylan niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de verpakking achter “Exp.:" of “Niet te gebruiken na:”. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand.

Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.

6. Aanvullende informatie

Wat bevat Ciprofloxacin Mylan

- Het werkzame bestanddeel is: ciprofloxacinhydrochloride monohydraat (overeenkomend met respectievelijk 250 mg en 500 mg ciprofloxacin).
- De andere bestanddelen zijn: microkristallijne cellulose, maïszetmeel, voorverstijfseld zetmeel, crospovidon, magnesiumstearaat, colloïdaal siliciumdioxide, hypromellose, titaandioxide (E171),

polydextrose, glyceroltriacetaat en macrogol 8000.

Hoe ziet Ciprofloxacin Mylan er uit en wat is de inhoud van de verpakking

Ciprofloxacin Mylan zijn witte, filmomhulde tabletten. De 250 mg tabletten zijn rond en hebben de opdruk 'CF | 250' aan de ene zijde en de opdruk 'G' aan de andere zijde. De 500 mg tabletten zijn ovaal en hebben de opdruk 'CF | 500' aan de ene zijde en de opdruk 'G' aan de andere zijde.

Ciprofloxacin Mylan 250 mg en 500 mg tabletten zijn verpakt in blisterverpakkingen met 1, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 100 of 120 tabletten.

Ciprofloxacin tabletten zijn verkrijgbaar in flacons met 6, 10, 12, 14, 16, 20, 100, 120 tabletten. Niet alle verpakkingen hoeven in de handel gebracht te worden.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Registratiehouder

Mylan B.V.
Dieselweg 25
3752 LB Bunschoten

Fabrikant vrijgifte

Merck S.L.
E-08100 Mollet del Vallès
Barcelona
Spanje

McDermott Laboratories Ltd t/a Gerard Laboratories,
Baldoyle Industrial Estate,
Grange Road, Dublin 13,
Ierland

Mylan BV,
Dieselweg 25
3752 LB Bunschoten,
Nederland

Generics [UK] Limited
Station Close
Potters Bar,
Hertfordshire, EN6 1TL
Verenigd Koninkrijk

In het register ingeschreven onder:

RVG 26276 (250 mg), RVG 26277 (500 mg).

Deze bijsluiter is goedgekeurd in augustus 2011.

Advies/medische voorlichting

Antibiotica worden gebruikt voor het genezen van bacteriële infecties. Ze werken niet tegen virale infecties. Als uw arts aan u antibiotica heeft voorgeschreven, dan heeft u die inderdaad nodig voor uw huidige ziekte. Ondanks antibiotica kunnen sommige bacteriën toch overleven of groeien. Dit fenomeen wordt resistentie genoemd: sommige behandelingen met antibiotica zijn niet meer effectief. Door een verkeerd gebruik van antibiotica neemt de weerstand toe. U kunt zelfs aan het resistent worden van bacteriën bijdragen en daardoor uw herstel vertragen of de werkzaamheid van de antibiotica verminderen als u de instructies van uw arts niet opvolgt, voor wat betreft:

- de hoeveelheid antibiotica die u moet gebruiken;
- hoe vaak u het geneesmiddel in moet nemen;
- hoe lang u het geneesmiddel in moet nemen.

Dus om de werkzaamheid van dit geneesmiddel te behouden:

- gebruik alleen antibiotica wanneer deze aan u worden voorgeschreven;
- volg de voorschriften van het recept strikt op;
- gebruik de antibiotica niet opnieuw zonder medisch voorschrift, zelfs niet als u een zelfde ziekte wilt bestrijden;
- geef uw antibioticum nooit door aan iemand anders; het is mogelijk niet geschikt voor diens ziekte;
- breng na het voltooien van de behandeling alle niet gebruikte geneesmiddelen terug naar de apotheek om er zeker van te zijn dat ze op de juiste manier worden weggegooid.