



Hydrocortisonacetaat 1% FNA ratiopharm, crème 10 mg/g

Lees deze bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel

- Bewaar deze bijsluiter, het kan nodig zijn om deze nogmaals door te lezen.
- Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
- Dit geneesmiddel is aan u persoonlijk voorgeschreven, geef dit geneesmiddel niet door aan anderen. Dit geneesmiddel kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als de verschijnselen dezelfde zijn als waarvoor u het geneesmiddel heeft gekregen.

Inhoud van deze bijsluiter:

1. Wat is Hydrocortisonacetaat 1% FNA ratiopharm, crème 10 mg/g en waarvoor wordt het gebruikt?
2. Wat u moet weten voordat u Hydrocortisonacetaat 1% FNA ratiopharm, crème 10 mg/g gebruikt.
3. Hoe wordt Hydrocortisonacetaat 1% FNA ratiopharm, crème 10 mg/g gebruikt?
4. Mogelijke bijwerkingen.
5. Hoe bewaart u Hydrocortisonacetaat 1% FNA ratiopharm, crème 10 mg/g?

Naam van het geneesmiddel:

Hydrocortisonacetaat 1% FNA ratiopharm, crème 10 mg/g.

Het werkzame bestanddeel is:

hydrocortisonacetaat.

Hydrocortisonacetaat 1% FNA ratiopharm, crème 10 mg/g bevat 10 mg hydrocortisonacetaat per gram hydrofiele crème.

Andere bestanddelen (hulpstoffen) zijn:

Cetiol, cetomacrogolwas, decyloleaat (E570), sorbinezuur (E200), sorbitol (E420) en water.

Registratiehouder:

ratiopharm Nederland bv, Postbus 2062, 1500 GB Zaandam.

In het register ingeschreven onder:

RVG 55536 – Hydrocortisonacetaat 1% FNA ratiopharm, crème 10 mg/g.

1. **Wat is Hydrocortisonacetaat 1% FNA ratiopharm, crème 10 mg/g en waarvoor wordt het gebruikt?**

Farmaceutische vorm en inhoud:

Crème.

PP pot met 500 g crème of Al-tube met 30 gram crème.

Geneesmiddelen groep:

Hydrocortisonacetaat hoort tot de groep van de corticosteroiden (bijnierschors hormonen). Het werkt ontstekingsremmend.

Gebruiken bij:

- de behandeling van verschillende huidaandoeningen, zoals b.v. eczeem
- de behandeling van huidaandoeningen die gepaard gaan met jeuk.

2. Wat u moet weten voordat u Hydrocortisonacetaat 1% FNA ratiopharm, crème 10 mg/g gebruikt.**Gebruik Hydrocortisonacetaat 1% FNA ratiopharm niet:**

- bij overgevoeligheid voor hydrocortisonacetaat of voor één van de overige bestanddelen van de hydrofiele crème.
- bij huidinfectie
- bij zweertjes, acne of wonden
- bij vissschubbenziekte (ichtyosis)
- bij verschrompelde en dunne huid.

Wees extra voorzichtig met Hydrocortisonacetaat 1% FNA ratiopharm:

- bij kinderen. U mag dit geneesmiddel alleen gebruiken bij kinderen op voorschrift van de arts.
- De hydrofiele crème niet toepassen op de oogleden.
- Pas de hydrofiele crème uitsluitend toe bij aandoeningen waarvoor uw arts het heeft voorgeschreven. Houdt u daarbij aan de aanbevolen gebruikstermijn.
- Als bij gebruik de klachten niet verdwijnen of zich herhalen moet u advies vragen aan uw arts.

Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is of dat in het verleden is geweest.

Zwangerschap:

Tijdens de zwangerschap alleen gebruiken na overleg met uw arts.

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel gebruikt.

Borstvoeding:

Tijdens de borstvoeding alleen gebruiken na overleg met uw arts.

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines:

Er zijn geen gegevens bekend over de invloed van dit product op de rijvaardigheid en het vermogen om machines te gebruiken. Een effect is echter niet waarschijnlijk.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Hydrocortisonacetaat 1% FNA ratiopharm:

Dit geneesmiddel bevat sorbinezuur (E200). Sorbinezuur is irriterend en kan ontsteking van de huid veroorzaken

Gebruik van Hydrocortisonacetaat 1% FNA ratiopharm in combinatie met andere geneesmiddelen:

Let op: de volgende opmerkingen kunnen ook van toepassing zijn op het gebruik van geneesmiddelen enige tijd geleden of in de nabije toekomst.

Onderstaande geneesmiddelen kunnen bij u bekend zijn onder een andere naam, vaak de merknaam. In deze rubriek wordt alleen de werkzame stof of de groep van de werkzame stoffen van het geneesmiddel genoemd en niet de merknaam! Kijk daarom altijd goed op de verpakking en in de bijsluiters wat de werkzame stof is van de geneesmiddelen die u gebruikt.

Een wisselwerking wil zeggen dat geneesmiddelen bij gelijktijdig gebruik elkaars werking en/of bijwerking beïnvloeden.

Er zijn geen wisselwerkingen bekend.

Informeer uw arts of apotheker wanneer u deze of andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt verkrijgen.

3. Hoe wordt Hydrocortisonacetaat 1% FNA ratiopharm, crème 10 mg/g gebruikt?

Dosering:

De hydrofiele crème 2-4 maal per dag (= 24 uur) dun op de huid aanbrengen, na enkele dagen 2 maal per dag aanbrengen.

Na verbetering is 2-3 maal per week aanbrengen meestal voldoende.

Niet meer dan 30-60 gram per week gebruiken.

Na gebruik de handen wassen.

Duur van de behandeling:

Uw arts zal u vertellen hoe lang u Hydrocortisonacetaat 1% FNA ratiopharm moet gebruiken.

In geval u bemerkt dat Hydrocortisonacetaat 1% FNA ratiopharm te sterk of juist te weinig werkt, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Wat u moet doen wanneer u teveel van Hydrocortisonacetaat 1% FNA ratiopharm heeft gebruikt:

Wanneer u teveel van Hydrocortisonacetaat 1% FNA ratiopharm heeft gebruikt, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Hydrocortisonacetaat 1% FNA ratiopharm te gebruiken:

Wanneer u vergeten bent Hydrocortisonacetaat 1% FNA ratiopharm te gebruiken, doe dit dan zo snel mogelijk alsnog. Als het echter bijna tijd is voor de volgende dosering, sla dan de gemiste dosering over en ga verder met uw normale doseringsschema. Raadpleeg bij twijfel altijd uw arts of apotheker.

Gebruik nooit een dubbele dosis van Hydrocortisonacetaat 1% FNA ratiopharm om zo de vergeten dosis in te halen.

Effecten die u kunt verwachten wanneer de behandeling met Hydrocortisonacetaat 1% FNA ratiopharm wordt gestopt:

Wanneer u plotseling stopt met het gebruik van dit geneesmiddel kunnen de verschijnselen die voor het begin van de behandeling bestonden weer optreden. Raadpleeg bij twijfel altijd uw arts of apotheker.

4. Mogelijke bijwerkingen.

Zoals alle geneesmiddelen kan Hydrocortisonacetaat 1% FNA ratiopharm bijwerkingen veroorzaken.

De volgende bijwerkingen kunnen onder andere optreden:

- dun en bleek worden van de huid
- rode huiduitslag rondom de mond en in het gezicht
- huidstriemen
- onderhuidse bloedinkjes.

Zelden komen overgevoelighedsreacties voor. De huidaandoening lijkt dan niet te genezen maar te verergeren.

Met name het gezicht, de behaarde huid en de huid van de geslachtsorganen zijn bijzonder gevoelig voor bovengenoemde bijwerkingen. Tevens neemt de kans op bijwerkingen toe bij toepassing van de hydrofiele crème op grote huidoppervlakken, onder plastic of in huidplooien.

In geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld of die u als ernstig ervaart, informeer dan uw arts of apotheker.

5. Hoe bewaart u Hydrocortisonacetaat 1% FNA ratiopharm, crème 10 mg/g?

Hydrocortisonacetaat 1% FNA ratiopharm buiten bereik en zicht van kinderen houden.

Om uitdroging en bederf te voorkomen de tube na gebruik goed sluiten en droog, beneden 25 °C bewaren in de goed gesloten, originele verpakking.

Uiterste gebruiksdatum:

Gebruik Hydrocortisonacetaat 1% FNA ratiopharm niet meer na de datum op de verpakking achter "niet te gebruiken na" of "exp".

De aanduiding "exp" betekent: "niet te gebruiken na". De eerste 2 cijfers geven de maand aan, de laatste cijfers het jaar.

*Deze bijsluiter is voor het laatst herzien op:
29 oktober 2004*