

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER

Theranal[®] aambeienzalf, zalf voor rectaal gebruik
Theranal[®] aambeienzepillen, zepillen
Werkzame bestanddelen: lidocaïne, zinkoxide, bismuthsubnitraat

Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit medicijn gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor u.

Gebruik dit medicijn altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts u dat heeft verteld.

- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw apotheker.
- Krijgt u last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts.
- *Wordt uw klacht na 14 dagen niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts*

Inhoud van deze bijsluiter

1. *Wat is Theranal aambeienzalf of Theranal aambeienzepillen en waarvoor wordt dit medicijn gebruikt?*
2. *Wanneer mag u dit medicijn niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?*
3. *Hoe gebruikt u dit medicijn?*
4. *Mogelijke bijwerkingen*
5. *Hoe bewaart u dit medicijn?*
6. *Inhoud van de verpakking en overige informatie*

1. Wat is Theranal aambeienzalf of Theranal aambeienzepillen en waarvoor wordt dit medicijn gebruikt?

Theranal wordt gebruikt bij plaatselijke pijn, branderigheid en jeuk bij inwendige en uitwendige aambeien. De actieve stoffen in dit medicijn zorgen ervoor dat deze klachten verminderen.

Lidocaïne heeft een plaatselijk verdovende werking en bestrijdt of verlicht het gevoel van pijn, jeuk, een branderig gevoel en irritatie.

Zinkoxide en bismuthsubnitraat hebben beide een samentrekkende werking op de bloedvaten van de aambeien.

2. Wanneer mag u dit medicijn niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit medicijn niet gebruiken?

- U bent allergisch voor een van de stoffen in dit medicijn. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6.
- Lijdt aan bloedende aambeien.
- Aandoeningen aan het hart.
- Overgevoelig bent voor één van de bestanddelen of voor lokale anesthetica van het amide-type, zoals bupivacaïne, mepivacaïne en prilocaïne.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit medicijn?

- Bij bloedingen en/of ontstekingen in het gebied waar dit medicijn toegepast moet worden; raadpleeg dan eerst uw huisarts.
- Wanneer geen verbetering optreedt na 14 dagen of de klachten regelmatig terugkomen, dient u uw arts te raadplegen.

Neem in de volgende situaties contact op met uw huisarts voordat u dit medicijn gaat gebruiken:

- u lijdt aan bloedvergiftiging.
- ernstige leverziekte.
- epilepsie.
- verhoogde schildklierwerking.
- uw kind is jonger dan 12 jaar en heeft een lichaamsgewicht van minder dan 25 kg.

Uw arts zal in deze situaties de dosering aanpassen.

Gebruikt u nog andere medicijnen?

Gebruikt u naast Theranal nog andere medicijnen, of gaat u dit misschien binnenkort doen? Vertel dat dan uw arts, tandarts of apotheker.

Zwangerschap en borstvoeding

Theranal kan beter niet worden gebruikt tijdens zwangerschap en borstvoeding, tenzij uw arts anders adviseert.

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Theranal heeft geen invloed op het reactievermogen.

Theranal aambeienzalf bevat

Cetylalcohol en wolvet kunnen plaatselijke huidreacties veroorzaken (bijv. contactdermatitis).

3. Hoe gebruikt u dit medicijn?

Gebruik dit medicijn altijd precies zoals in deze bijsluiter staat of zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Dosering en wijze van toediening

Theranal aambeienzalf

Bij inwendige aambeien:

Schroef de canule op de tube en breng de zalf zorgvuldig aan door na het inbrengen van de canule in de anus in de tube te knijpen.

Bij uitwendige aambeien:

Reinig de anale opening goed. Hiertoe kunt u bijvoorbeeld een watje met een beetje aambeienzalf gebruiken. Afdrogen en de zalf in ruime mate aanbrengen.

De aanbevolen dosering is:

De zalf 's ochtends en 's avonds en na iedere stoelgang gebruiken.

Theranal aambeienzetpillen

Bij inwendige aambeien:

De zetpil met de bolle kant naar voren voorzichtig zo diep mogelijk in de endeldarm brengen.

De aanbevolen dosering is: Bij het begin van de behandeling en in chronische gevallen tweemaal daags één zetpil gebruiken ('s ochtends en 's avonds). In lichtere gevallen kan met één zetpil worden volstaan.

	Uitwendige aambeien	Inwendige aambeien
Theranal aambeienzalf	X	X
Theranal aambeienzetpillen		X

Als u bemerkt dat Theranal te sterk of juist te weinig werkt, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Gebruik Theranal niet langer dan 14 dagen zonder een arts te raadplegen.

Heeft u te veel van dit medicijn gebruikt?

Wanneer u teveel van Theranal heeft gebruikt, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker. Laat dan bij voorkeur de verpakking of bijsluiter zien.

Bij toepassing op de intacte huid is de kans op overdosering als gevolg van lidocaïne of bismuthsubnitraat gering. Bij toepassing op de beschadigde huid kan overdosering als gevolg van lidocaïne gepaard gaan met. gapen, rusteloosheid, duizeligheid, misselijkheid, braken, problemen met praten, bewegen en dingen niet goed horen of zien. Een zeer ernstige overdosering als gevolg van bismuthsubnitraat kan gepaard gaan met nierfalen.

Neem bij twijfel contact op met uw arts of apotheker.

Bent u vergeten dit medicijn te gebruiken

U kunt in dat geval de normale dosering op het volgende tijdstip toepassen. Gebruik geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

4. Mogelijke bijwerkingen

Zoals alle geneesmiddelen kan ook dit medicijn bijwerkingen veroorzaken. Niet iedereen krijgt daarmee te maken.. Gebruik van Theranal kan aanleiding geven tot huidreacties; een plaatselijk branderig gevoel en soms overgevoeligheidsverschijnselen.

Het melden van bijwerkingen

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via www.lareb.nl. Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

5. Hoe bewaart u dit medicijn?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Bewaren beneden 25°C. Niet in de koelkast of vriezer bewaren. Gebruik dit medicijn niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die vindt u op de doos, tube of kunststof strip 'Exp' {afkorting gebruikt voor de vervaldatum}. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Na het aanbreken van de tube is Theranal aambeienzalf 6 maanden houdbaar.

Spoel medicijnen niet door de gootsteen of de wc en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die u niet meer gebruikt. Als u medicijnen op de juiste manier afvoert worden ze op een juiste manier vernietigd en komen ze niet in het milieu terecht

6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

Welke stoffen zitten er in dit medicijn?

Theranal aambeienzalf:

De werkzame bestanddelen per gram zalf in dit middel: 130 mg zinkoxide, 27 mg bismuthsubnitraat en 18 mg lidocaïne.

De andere stoffen in dit medicijn zijn: aluminiumchlorhydroxyallantoïnaat, gele vaseline, wolvet, vloeibare paraffine, thymol en cetylalcohol.

Theranal aambeienzepillen:

De werkzame bestanddelen in dit middel: 100 mg bismuthsubnitraat, 450 mg zinkoxide en 60 mg lidocaïne.

De andere stoffen in dit medicijn zijn: aluminiumchlorhydroxyallantoïnaat, aluminiumhydroxyallantoïn acetyl methionaat, witepsol.

Hoe ziet Theranal er uit en wat zit er in een verpakking?

Theranal aambeienzalf is een bijna witte zalf en is verpakt in een tube van 35 g met een canule.

Theranal aambeienzepillen zijn wit en verkrijgbaar in een verpakking met een kunststof strip van 12 zepillen.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Registratiehouder: Bayer B.V., Siriusdreef 36, 2132 WT Hoofddorp.

Voor inlichtingen: Consumer Health Division, Postbus 88, 2130 AB Hoofddorp.

Fabrikant: Famar Avlona, Griekenland.

Theranal aambeienzalf en Theranal aambeienzepillen zijn in het register ingeschreven onder respectievelijk RVG 01110 en RVG 01111.

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in augustus 2022.