


<b>Rabeprazolnatrium Aurobindo 10 mg, 20 mg, maagsapresistente tabletten</b> <b>RVG 109588, 109589</b>	 <b>AUROBINDO</b>
<b>Module 1</b> Administrative information and prescribing information	
<b>1.3.1 Bijsluiter</b>	Rev.nr. 1801a      Pag. 1 van 8

## **BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER**

### **Rabeprazolnatrium Aurobindo 10 mg, maagsapresistente tabletten** **Rabeprazolnatrium Aurobindo 20 mg, maagsapresistente tabletten**

rabeprazolnatrium

**Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor u.**

- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige.
- Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen, want het is alleen aan u voorgeschreven. Het kan schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u.
- Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige.

#### **Inhoud van deze bijsluiter**

1. Wat is Rabeprazolnatrium Aurobindo en waarvoor wordt dit middel gebruikt?
2. Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe gebruikt u dit middel?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u dit middel?
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie


### **1. WAT IS RABEPRAZOLNATRIUM AUROBINDO EN WAARVOOR WORDT DIT MIDDEL GEBRUIKT?**

Rabeprazolnatrium Aurobindo tabletten bevatten als werkzame stof rabeprazolnatrium. Dit geneesmiddel behoort tot de zogenaamde protonpompremmers. Die zorgen ervoor dat uw maag minder zuur aanmaakt.

Rabeprazolnatrium Aurobindo tabletten worden gebruikt voor behandeling van de volgende aandoeningen:

- een ontsteking in de slokdarm als gevolg van terugvloeiend maagzuur (gastro-oesofageale refluxziekte (GORZ)). Hierbij kunt u last hebben van zuurbranden. Slokdarmontsteking wordt veroorzaakt door terugvloeiing van zuur en voedsel uit de maag naar de slokdarm (oesofagus)
- zweren in uw maag of het bovenste deel van de darm (de dunne darm). Als deze zweren geïnfecteerd zijn met de zogenaamde *Helicobacter pylori*-bacteriën (*H. Pylori*), zult u ook antibiotica krijgen. Door Rabeprazolnatrium Aurobindo tabletten en antibiotica samen te gebruiken, verdwijnt de infectie en geneest de zweer. Deze behandeling voorkomt ook dat de infectie en de zweren terugkomen
- het Zollinger-Ellison syndroom, een aandoening waarbij de maag te grote hoeveelheden zuur aanmaakt.

### **2. WANNEER MAG U DIT MIDDEL NIET GEBRUIKEN OF MOET U ER EXTRA VOORZICHTIG MEE ZIJN?**

<b>Rabeprazolnatrium Aurobindo 10 mg, 20 mg, maagsapresistente tabletten</b> <b>RVG 109588, 109589</b>	 <b>AUROBINDO</b>
<b>Module 1</b> Administrative information and prescribing information	
<b>1.3.1</b> Bijsluiter	Rev.nr. 1801a      Pag. 2 van 8

### **Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?**

- als u allergisch bent voor rabeprazolnatrium of voor één van de andere stoffen die in dit geneesmiddel zitten (zie rubriek 6)
- als u zwanger bent of denkt dat u zwanger bent
- als u borstvoeding geeft.

Gebruik Rabeprazolnatrium Aurobindo niet als één van bovenstaande situaties voor u geldt. Als u dat niet zeker weet, neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u Rabeprazolnatrium Aurobindo inneemt.

Zie ook de rubriek “Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid”.

### **Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?**

Neem contact op met uw arts voordat u dit middel gebruikt als:

- u allergisch bent voor andere protonpompremmers of zogeheten “gesubstitueerde benzimidazolen”
- bij enkele patiënten zijn problemen met hun bloed en hun lever gezien, maar die verbeteren vaak als men met Rabeprazolnatrium Aurobindo stopt
- u maagkanker heeft
- u wel eens problemen met uw lever heeft gehad
- u het geneesmiddel atazanavir gebruikt voor hiv/aids
- bij u een specifiek bloedonderzoek (chromogranine A) moet worden uitgevoerd
- als u ooit een huidreactie kreeg na behandeling met een geneesmiddel vergelijkbaar met Rabeprazolnatrium Aurobindo dat de productie van maagzuur remt.
- als u verminderde lichaamsreserves heeft of risicofactoren voor een verminderde vitamine B12 opname en u wordt langdurig behandeld met rabeprazolnatrium. Zoals met alle zuurremmende geneesmiddelen kan rabeprazolnatrium leiden tot een verminderde opname van vitamine B12.
- Vertel het uw arts zo snel mogelijk als u huiduitslag krijgt, vooral op plekken die blootgesteld worden aan zonlicht, aangezien u uw behandeling met Rabeprazolnatrium Aurobindo mogelijk zal moeten stopzetten. Denk eraan ook melding te maken van andere bijwerkingen zoals pijn in uw gewrichten.

Als u niet zeker weet of er bij u sprake is van één van de bovenstaande situaties, neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u Rabeprazolnatrium Aurobindo inneemt.


### **Kinderen**

Kinderen mogen Rabeprazolnatrium Aurobindo niet gebruiken.

Als u ernstige diarree (waterig of bloederig) krijgt met symptomen zoals koorts, buikpijn of gevoeligheid van de buik, stop dan met het gebruik van Rabeprazolnatrium Aurobindo en ga onmiddellijk naar uw arts.

Bij het gebruik van een protonpompremmer zoals rabeprazol, met name voor een periode langer dan 1 jaar, is er mogelijk een licht verhoogde kans op het breken van de heup, pols of wervelkolom. Vertel het uw arts als u osteoporose heeft of wanneer u corticosteroïden gebruikt (deze medicatie kan het risico op osteoporose verhogen).

### **Neemt u nog andere geneesmiddelen in?**

<b>Rabeprazolnatrium Aurobindo 10 mg, 20 mg, maagsapresistente tabletten</b> <b>RVG 109588, 109589</b>	
<b>Module 1</b> Administrative information and prescribing information	
<b>1.3.1 Bijsluiter</b>	Rev.nr. 1801a      Pag. 3 van 8

Gebruikt u naast Rabeprazolnatrium Aurobindo nog andere geneesmiddelen, heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

Vertel het uw arts of apotheker in het bijzonder als u één van de volgende geneesmiddelen gebruikt:

- ketoconazol of itraconazol – gebruikt voor de behandeling van schimmelinfecties. Rabeprazolnatrium Aurobindo kan de hoeveelheid van dit type geneesmiddelen in uw bloed verlagen. Het kan zijn dat uw arts de dosering bij u moet aanpassen
- atazanavir - gebruikt voor de behandeling van hiv/aids. Rabeprazolnatrium Aurobindo kan de hoeveelheid van dit type geneesmiddelen in uw bloed verlagen, deze geneesmiddelen mogen daarom niet tegelijk worden gebruikt.
- Methotrexaat (een chemotherapie geneesmiddel dat wordt gebruikt in hoge doses voor de behandeling van kanker) - als u een hoge dosis methotrexaat gebruikt, kan uw arts uw behandeling met Rabeprazol Aurobindo tijdelijk stoppen.

Als u niet zeker weet of u één van de bovenstaande geneesmiddelen gebruikt, neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u Rabeprazolnatrium Aurobindo inneemt.

#### **Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid**

- gebruik Rabeprazolnatrium Aurobindo niet als u zwanger bent of denkt dat u zwanger zou kunnen zijn
- gebruik Rabeprazolnatrium Aurobindo niet als u borstvoeding geeft of borstvoeding wilt gaan geven.

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

#### **Rijvaardigheid en het gebruik van machines**

U kunt zich slaperig voelen bij gebruik van Rabeprazolnatrium Aurobindo. Als dit gebeurt, bestuur dan geen voertuig en bedien geen gereedschappen of machines.

### **3. HOE GEBRUIKT U DIT MIDDEL?**

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

#### **Hoe moet u Rabeprazolnatrium Aurobindo innemen?**


- haal alleen een tablet uit de strip als het tijd is om uw geneesmiddel in te nemen.
- slik de tabletten heel door met een slok water. U mag de tabletten niet kauwen of pletten.
- uw arts zal u zeggen hoeveel tabletten u moet innemen en hoe lang u ze moet blijven innemen. Dit hangt af van welke aandoening u heeft.
- als u dit geneesmiddel langdurig gebruikt, zal uw arts u af en toe willen controleren.

#### **Volwassenen en ouderen**

#### **Voor slokdarmontsteking (gastro-oesofageale refluxziekte (GORZ))**

#### **Bij matige tot ernstige klachten van slokdarmontsteking (symptomatische GORZ)**

- de gebruikelijke dosering is één tablet Rabeprazolnatrium Aurobindo van 10 mg eenmaal per dag gedurende maximaal 4 weken

<b>Rabeprazolnatrium Aurobindo 10 mg, 20 mg, maagsapresistente tabletten</b> <b>RVG 109588, 109589</b>	
<b>Module 1</b> Administrative information and prescribing information	
<b>1.3.1</b> Bijsluiter	Rev.nr. 1801a      Pag. 4 van 8

- neem de tablet 's morgens voor het ontbijt in
- als uw klachten na 4 weken behandeling terugkomen, kan uw arts u zeggen dat u één tablet Rabeprazolnatrium Aurobindo van 10 mg kunt innemen op het moment dat u klachten heeft.

#### **Bij ernstige klachten van slokdarmontsteking (GORZ met aantasting van de slokdarm)**

- de gebruikelijke dosering is één tablet Rabeprazolnatrium Aurobindo van 20 mg eenmaal per dag gedurende 4 tot 8 weken
- neem de tablet 's morgens voor het ontbijt in.

#### **Voor langdurige behandeling van slokdarmklachten (GORZ onderhoudsbehandeling)**

- de gebruikelijke dosering is één tablet Rabeprazolnatrium Aurobindo van 10 mg of 20 mg eenmaal per dag zo lang als uw arts heeft gezegd
- neem de tablet 's morgens voor het ontbijt in
- uw arts zal u regelmatig willen zien om uw klachten en de dosering te controleren.

#### **Voor maagzweren (ulcus pepticum)**

- de gebruikelijke dosering is één tablet Rabeprazolnatrium Aurobindo van 20 mg eenmaal per dag gedurende 6 weken
- neem de tablet 's morgens voor het ontbijt in
- uw arts kan u voorschrijven om Rabeprazolnatrium Aurobindo nog 6 weken te gebruiken als uw klachten niet zijn verbeterd.

#### **Voor zweren van de dunne darm (ulcus duodenum)**

- de gebruikelijke dosering is één tablet Rabeprazolnatrium Aurobindo van 20 mg eenmaal per dag gedurende 4 weken
- neem de tablet 's morgens voor het ontbijt in
- uw arts kan u voorschrijven om Rabeprazolnatrium Aurobindo nog 4 weken te gebruiken als uw klachten niet zijn verbeterd.

#### **Voor zweren veroorzaakt door infectie met Helicobacter pylori en om terugkeer te voorkomen**

- de gebruikelijke dosering is één tablet Rabeprazolnatrium Aurobindo van 20 mg tweemaal per dag gedurende 7 dagen
- uw arts zal u ook antibiotica voorschrijven, namelijk amoxicilline en claritromycine. Raadpleeg de betreffende afzonderlijke bijsluiters voor meer informatie over de andere geneesmiddelen die worden gebruikt bij de behandeling van Helicobacter pylori.


#### **Voor Zollinger-Ellison syndroom met overmatige zuurproductie in de maag**

- de gebruikelijke dosering is drie tabletten Rabeprazolnatrium Aurobindo van 20 mg eenmaal per dag, om te beginnen
- daarna kan de dosis door uw arts worden aangepast, afhankelijk van hoe u op de behandeling reageert.

Als u langdurig wordt behandeld, zult u regelmatig naar de arts moeten om uw tabletten en klachten opnieuw te bekijken.

#### **Patiënten met leverproblemen**

Neem contact op met uw arts, deze zal extra voorzichtig zijn bij het begin van de behandeling met Rabeprazolnatrium Aurobindo en als u doorgaat met de behandeling met Rabeprazolnatrium Aurobindo.

<b>Rabeprazolnatrium Aurobindo 10 mg, 20 mg, maagsapresistente tabletten</b> <b>RVG 109588, 109589</b>	 <b>AUROBINDO</b>
<b>Module 1</b> Administrative information and prescribing information	
<b>1.3.1</b> Bijsluiter	Rev.nr. 1801a      Pag. 5 van 8

### Heeft u te veel van dit middel ingenomen?

Raadpleeg altijd een arts of ga meteen naar de eerste hulpafdeling/het ziekenhuis als u te veel Rabeprazolnatrium Aurobindo heeft ingenomen. Neem het doosje tabletten mee.

### Bent u vergeten dit middel in te nemen?

- wanneer u bent vergeten uw dosis in te nemen, neem dan de vergeten dosis in zodra u daaraan denkt. Maar als het al bijna tijd is voor de volgende dosis, sla de vergeten dosis dan over en ga op de gewone manier door met het gebruik
- als u uw geneesmiddel meer dan 5 dagen bent vergeten in te nemen, raadpleeg dan uw arts voordat u Rabeprazolnatrium Aurobindo weer inneemt
- neem geen dubbele dosis (twee doses op hetzelfde tijdstip) om de vergeten dosis in te halen.

### Als u stopt met het innemen van dit middel

Normaal gesproken zullen uw klachten al verbeteren voordat de zweer of ontsteking volledig is genezen. Het is belangrijk dat u niet eerder stopt met het innemen van de tabletten dan uw arts heeft gezegd.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

## 4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken. De bijwerkingen zijn gewoonlijk licht en verbeteren zonder dat u met het gebruik van Rabeprazolnatrium Aurobindo hoeft te stoppen.

### Stop met het innemen van Rabeprazolnatrium Aurobindo en ga meteen naar de arts als u één van de volgende bijwerkingen merkt; het kan zijn dat u met spoed moet worden behandeld:

- allergische reacties – aanwijzingen hiervoor zijn: plotseling gezwollen gezicht, moeilijk ademhalen of lage bloeddruk, wat kan leiden tot flauwvallen
- veelvuldige infecties zoals keelpijn of hoge temperatuur (koorts) of zweertjes in uw mond of keel
- gemakkelijk bloeden of blauwe plekken krijgen.


Deze bijwerkingen zijn zeldzaam (kan voorkomen bij minder dan 1 op de 1000 gebruikers)

- ernstige blaarvorming op de huid of pijn en zweertjes in uw mond of keel.
- Deze bijwerkingen zijn zeer zeldzaam (kan voorkomen bij minder dan 1 op de 10.000 gebruikers).

### Andere mogelijke bijwerkingen:

Vaak (kan voorkomen bij minder dan 1 op de 10 gebruikers)

- infecties
- slaapproblemen
- hoofdpijn of duizeligheid
- hoesten, loopneus of keelpijn
- effecten op uw maag of darm zoals maagpijn, diarree, winderigheid, misselijkheid, braken of verstopping
- rugpijn of andere pijn
- zwakte of griepachtige verschijnselen.
- benigne poliepen in de maag

<b>Rabeprazolnatrium Aurobindo 10 mg, 20 mg, maagsapresistente tabletten</b> <b>RVG 109588, 109589</b>	 <b>AUROBINDO</b>
<b>Module 1</b> Administrative information and prescribing information	
<b>1.3.1</b> Bijsluiter	Rev.nr. 1801a      Pag. 6 van 8

Soms (kan voorkomen bij minder dan 1 op de 100 gebruikers)

- nerveus of slaperig gevoel
- ontsteking van de luchtwegen (bronchitis)
- verstopte en pijnlijke neus-, bij- en voorhoofdsholtes (sinusitis)
- droge mond
- maag-darmstoornissen, opboeren
- huiduitslag of rode huid
- spierpijn, gewrichtspijn, beenkramp
- breuken van de heup, pols en wervelkolom
- blaasontsteking (infectie van de urinewegen)
- pijn op de borst
- koude rillingen of koorts
- veranderingen in de werking van uw lever (te zien in bloedonderzoek).


Zelden (kan voorkomen bij minder dan 1 op de 1000 gebruikers)

- verlies van eetlust (anorexia)
- depressie
- overgevoeligheid (onder andere allergische reacties)
- zichtstoornissen
- pijnlijke mond (stomatitis) of verstoorde smaak
- lichte maagstoornis of maagpijn
- leverproblemen met onder andere geel worden van de huid en van het wit van de ogen (geelzucht)
- huiduitslag met jeuk of blaarvorming van de huid
- zweten
- nierproblemen
- gewichtstoename
- veranderingen in witte bloedcellen (te zien in bloedonderzoek) die kunnen leiden tot regelmatige infecties
- vermindering van het aantal bloedplaatjes, wat ertoe kan leiden dat u gemakkelijker bloedt of blauwe plekken krijgt dan normaal.

Andere mogelijke bijwerkingen (Niet bekend - de frequentie kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald)

- zwellen van de borsten bij mannen
- vasthouden van vocht
- lage hoeveelheid natrium in het bloed, wat kan leiden tot vermoeidheid en verwardheid, spiertrekkingen, stuipen en coma
- patiënten die in het verleden leverproblemen hebben gehad, kunnen in zeer zeldzame gevallen een hersenaandoening (encefalopathie) krijgen
- huiduitslag, met mogelijk pijn in de gewrichten.
- Ontsteking van de darmen (die diarree veroorzaakt)

Als u rabeprazol langer dan 3 maanden gebruikt, is het mogelijk dat u een te laag magnesiumgehalte in uw bloed krijgt. Een te laag gehalte magnesium kan zich uiten in klachten als vermoeidheid, onvrijwillige spiertrekkingen, verwardheid (desoriëntatie), toevallen/stuipen (convulsies), duizeligheid en een versnelde hartslag. Als u één van deze symptomen heeft, neem dan meteen contact op met uw arts. Een te laag magnesiumgehalte kan ook leiden tot een verlaagd calcium- of kaliumgehalte in het

<b>Rabeprazolnatrium Aurobindo 10 mg, 20 mg, maagsapresistente tabletten</b> <b>RVG 109588, 109589</b>	 <b>AUROBINDO</b>
<b>Module 1</b> Administrative information and prescribing information	
<b>1.3.1 Bijsluiter</b>	Rev.nr. 1801a      Pag. 7 van 8

bloed. Uw arts kan besluiten om regelmatig bloedonderzoek te doen om uw magnesiumgehalte te bepalen

Word niet ongerust door deze lijst met bijwerkingen. Het kan zijn dat u geen enkele bijwerking krijgt.

### Het melden van bijwerkingen

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb ([www.lareb.nl](http://www.lareb.nl)). Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

## 5. HOE BEWAART U DIT MIDDEL?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Bewaren beneden 25°C. Gebruik binnen 3 maanden na eerste opening van de HDPE-fles. Slik het droogmiddel niet in. Er kunnen meer dan één droogmiddelzakje in de container zitten. Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen vocht.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op het etiket van de fles, de doos of de blisterverpakking na “Exp.:”. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

## 6. INHOUD VAN DE VERPAKKING EN OVERIGE INFORMATIE

### Welke stoffen zitten er in dit middel?

De werkzame stof in dit middel is rabeprazolnatrium.

Elke maagsapresistente tablet bevat 10 mg rabeprazolnatrium, wat overeenkomt met 9,42 mg rabeprazol.

Elke maagsapresistente tablet bevat 20 mg rabeprazolnatrium, wat overeenkomt met 18,85 mg rabeprazol.

De andere stoffen zijn:

*Tabletkern:* mannitol, magnesiumoxide zwaar, hydroxypropylcellulose, crospovidon, licht gesubstitueerde hydroxypropylcellulose, magnesiumstearaat, licht.

*Onder coating:* ethylcellulose, magnesiumoxide.


*Enterische coating:* hypromelloseftalaat, tweevoudig geacetylerde monoglyceriden, talk, titanium dioxide (E171), geel ijzeroxide (E172) (20 mg alleen).

### Hoe ziet Rabeprazolnatrium Aurobindo eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

Maagsapresistente tablet.

Rabeprazolnatrium Aurobindo 10 mg, maagsapresistente tabletten zijn ronde (diameter 5,72 mm), witte, dubbelbolle, maagsapresistente tabletten.



<b>Rabeprazolnatrium Aurobindo 10 mg, 20 mg, maagsapresistente tabletten</b> <b>RVG 109588, 109589</b>	 <b>AUROBINDO</b>
<b>Module 1</b> Administrative information and prescribing information	
<b>1.3.1</b> Bijsluiter	Rev.nr. 1801a      Pag. 8 van 8

Rabeprazolnatrium Aurobindo 20 mg, maagsapresistente tabletten zijn ronde (diameter 7,17 mm), gele, dubbelbolle, maagsapresistente tabletten.

Rabeprazolnatrium Aurobindo maagsapresistente tabletten zijn verkrijgbaar in Polyamide/Aluminium /PVC/Aluminiumfolie blisterverpakking en HDPE-fles met silicagel droogmiddel en een dop van sabotagebestendig polypropyleen.

### Verpakkingsgrootten

Blisterverpakking: 7, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 98, 100 en 120 maagsapresistente tabletten.  
HDPE-fles: 30 en 90 maagsapresistente tabletten.

Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

### Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Aurobindo Pharma B.V.  
Baarnsche Dijk 1  
3741 LN Baarn  
Nederland

### Fabrikant

APL Swift Services (Malta) Limited  
HF26, Hal Far Industrial Estate, Hal Far  
Birzebbugia, BBG 3000  
Malta

of

Milpharm Limited  
Ares Block  
Odyssey Business Park  
West End Road  
Ruislip HA4 6QD  
Verenigd Koninkrijk

### In het register ingeschreven onder:

Rabeprazolnatrium Aurobindo 10 mg, maagsapresistente tabletten:                   RVG 109588  
Rabeprazolnatrium Aurobindo 20 mg, maagsapresistente tabletten:               RVG 109589

### Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen:

Frankrijk	RABEPRAZOLE ARROW 10 mg/ 20 mg, comprimé gastro-résistant
Duitsland	Rabeprazol Aurobindo 10 mg/ 20 mg Magensaftresistente Tabletten
Italië	Rabeprazolo Aurobindo
Malta	Rabeprazole Aurobindo 10 mg/ 20 mg Gastro-resistant tablets
Nederland	Rabeprazolnatrium Aurobindo 10 mg/ 20 mg, maagsapresistente tabletten
Portugal	Rabeprazol Aurobindo, 10 mg/ 20 mg, comprimido gastrorresistente
Spanje	Rabeprazol Aurobindo 10 mg/ 20 mg comprimidos gastrorresistentes
Verenigd Koninkrijk	Rabeprazole Sodium 10 mg/ 20 mg Gastro-resistant tablets

### Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in februari 2018

Gedetailleerde informatie over dit geneesmiddel is beschikbaar op de website van het CBG:

[www.geneesmiddeleninformatiebank.nl](http://www.geneesmiddeleninformatiebank.nl).