

| | | |
|---|------------|--|
| Albert Heijn B.V., Zaandam, The Netherlands | | Module 1 Administrative information and prescribing information |
| Albert Heijn Ibuprofen liquid caps 400 mg, capsules, zacht | RVG 117587 | |
| ibuprofen | | |
| 1.3.1.3 Package leaflet | | 1.3.1.3 / 1 van 9 |

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER

Albert Heijn Ibuprofen liquid caps 400 mg capsules, zacht

Voor gebruik bij volwassenen en adolescenten van 40 kg of zwaarder (12 jaar of ouder)

ibuprofen

Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen, want er staat belangrijke informatie in voor u.

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld.

- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw apotheker.
- Krijgt u last van één van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
- Volwassenen: Wordt uw klacht na 5 dagen (in geval van pijn) of na 3 dagen (in geval van koorts en migraine) niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts.
- Adolescenten (12 – 18 jaar oud): Indien dit geneesmiddel langer dan 3 dagen moet worden gebruikt door adolescenten of indien symptomen verergeren, dient een arts geraadpleegd te worden.

Inhoud van deze bijsluiter

1. Wat is Albert Heijn Ibuprofen liquid caps en waarvoor wordt dit middel gebruikt?
2. Wanneer mag u dit middel niet innemen of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe neemt u dit middel in?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u dit middel?
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

1. WAT IS ALBERT HEIJN IBUPROFEN LIQUID CAPS EN WAARVOOR WORDT DIT MIDDEL GEBRUIKT?

Albert Heijn Ibuprofen liquid caps bevat een medicijn genaamd ibuprofen. Ibuprofen behoort tot een groep geneesmiddelen die niet-steroïde ontstekingsremmers (NSAID's) worden genoemd. Deze geneesmiddelen bieden verlichting bij pijn en koorts.

Albert Heijn Ibuprofen liquid caps wordt gebruikt bij volwassenen en adolescenten met een lichaamsgewicht van 40 kg of zwaarder (12 jaar of ouder) om:

- verschijnselen van lichte tot matige pijn zoals hoofdpijn, acute migraine met of zonder aura, spierpijn, menstratiepijn te verlichten, en
- koorts en pijn bij verkoudheid te verminderen.

2. WANNEER MAG U DIT MIDDEL NIET INNEMEN OF MOET U ER EXTRA VOORZICHTIG MEE ZIJN?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

| | | | | | |
|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------------|----------|--------------|
| Department of Regulatory Affairs | Date: 2018-04 | Authorisation | Case manager: AO | Rev. 2.4 | Approved MEB |
|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------------|----------|--------------|

| | | |
|---|------------|--|
| Albert Heijn B.V., Zaandam, The Netherlands | | Module 1 Administrative information and prescribing information |
| Albert Heijn Ibuprofen liquid caps 400 mg, capsules, zacht | RVG 117587 | |
| ibuprofen | | |
| 1.3.1.3 Package leaflet | | 1.3.1.3 / 2 van 9 |

- U bent allergisch (overgevoelig) voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder rubriek 6.
- Als u ooit last heeft gehad van kortademigheid, astma, loopneus, zwelling of (jeukende) huiduitslag nadat u acetylsalicylzuur (aspirine) of andere vergelijkbare pijnstillers (NSAID's) heeft gebruikt.
- Als u een voorgeschiedenis heeft van een maagdarmbloeding of -perforatie in samenhang met eerdere behandeling met NSAID's.
- Als u een maagzweer of maagbloeding heeft (of twee of meer episoden van een maagzweer of maagbloeding heeft gehad).
- Als u een bloedstollingsstoornis heeft of als u een andere bloedingsstoornis heeft.
- Als u een ernstige lever- of nierziekte of ernstig hartfalen heeft.
- Als u een hersenbloeding of een andere actieve bloeding heeft.
- Als bij u sprake is van niet-opgehelderde stoornissen in de bloedaanmaak.
- Als u lijdt aan ernstige uitdroging (veroorzaakt door braken, diarree of onvoldoende vochtinname).
- Tijdens de laatste drie maanden van de zwangerschap.
- Als u al andere NSAID pijnstillers gebruikt (inclusief COX 2 remmers) of als u aspirine gebruikt in een dosering van meer dan 75 mg per dag.

Albert Heijn Ibuprofen liquid caps mag niet worden gebruikt bij adolescenten met een lichaamsgewicht lager dan 40 kg en bij kinderen.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel inneemt als u:

- Last heeft van systemische lupus erythematosus (SLE) (een auto-immuunziekte van het bindweefsel die zich uit in gewrichtspijn, huidveranderingen en stoornissen van andere organen) of gemengde bindweefselziekte.
- Last heeft van ernstige huidreacties, zoals exfoliatieve dermatitis, Stevens-Johnson syndroom en toxische epidermale necrolyse heeft. Inname van Albert Heijn Ibuprofen liquid caps moet bij de eerste verschijnselen van huiduitslag, slijmvliesbeschadigingen of andere tekenen van allergische reacties onmiddellijk worden gestaakt.
- Een erfelijke stoornis heeft in de aanmaak van bloed (acute intermitterende porfyrie).
- Een darmziekte (colitis ulcerosa of de ziekte van Crohn) heeft of ooit heeft gehad.
- Astma of een allergische aandoening heeft of heeft gehad, aangezien er kortademigheid kan optreden.
- Last heeft van hooikoorts, neuspoliepen of chronische obstructieve ademhalingsaandoeningen. U heeft dan een verhoogd risico op allergische reacties. Deze allergische reacties kunnen zich voordoen als astma-aanvallen (zogenoemd analgetisch astma), quincke-oedeem of huiduitslag met hevige jeuk (netelroos) en vorming van bultjes (galbulten) (urticaria).
- Op leeftijd bent, aangezien er bij u eerder bijwerkingen kunnen optreden.
- Een nier- of leverziekte heeft.
- Zojuist een zware operatieve ingreep heeft gehad.
- Oedeem (zwelling) heeft.
- Zwanger wilt worden (ibuprofen behoort tot een groep geneesmiddelen (NSAID's) die de vruchtbaarheid van vrouwen nadelig kan beïnvloeden. Dit effect is omkeerbaar door te stoppen met het gebruik van het geneesmiddel).
- In de eerste zes maanden van de zwangerschap bent.

Bijwerkingen worden tot een minimum beperkt door de kleinste effectieve dosis zo kort mogelijk te gebruiken.

Ontstekingsremmers/pijnstillers zoals ibuprofen kunnen in verband worden gebracht met een klein verhoogd risico op hartaanval of beroerte, met name bij hoge doses. U mag de aanbevolen dosis of duur van de behandeling niet overschrijden.

| | | | | | |
|-------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|-----------------|---------------------|
| Department of Regulatory Affairs | Date: 2018-04 | Authorisation | Case manager: AO | Rev. 2.4 | Approved MEB |
|-------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|-----------------|---------------------|

| | | |
|---|------------|--|
| Albert Heijn B.V., Zaandam, The Netherlands | | Module 1 Administrative information and prescribing information |
| Albert Heijn Ibuprofen liquid caps 400 mg, capsules, zacht | RVG 117587 | |
| ibuprofen | | |
| 1.3.1.3 Package leaflet | | 1.3.1.3 / 3 van 9 |

Bespreek uw behandeling met uw arts of apotheker voordat u dit middel inneemt als u:

- Hartproblemen heeft, inclusief hartfalen, angina (pijn op de borst) of als u een hartaanval, een bypass-operatie, perifere arteriële ziekte (slechte circulatie in benen of voeten als gevolg van nauwe of geblokkeerde aders) of een beroerte (inclusief 'mini-beroerte' of transiënte ischemische attack 'TIA') heeft gehad.
- Hoge bloeddruk, diabetes of hoog cholesterol heeft, een familiegeschiedenis met hartproblemen of beroerte heeft, of als u rookt.

Tijdens waterpokken (varicella) wordt aangeraden het gebruik van Albert Heijn Ibuprofen liquid caps te vermijden.

Bij langdurige toediening van Albert Heijn Ibuprofen liquid caps moeten uw leverwaarden, nierfunctie en het bloedbeeld regelmatig worden gecontroleerd.

Langdurig gebruik van elk type pijnstiller tegen hoofdpijn, kan de hoofdpijn verergeren. Als u dit ervaart of vermoedt, dan moet u stoppen met het innemen van dit geneesmiddel en uw arts raadplegen.

In het algemeen kan frequent gebruik van (verschillende soorten) pijnstillers leiden tot blijvende, ernstige nierproblemen. Dit risico kan toenemen bij lichamelijke overbelasting in verband met vochtverlies. Neem dit geneesmiddel niet in als u merkt dat u vochtverlies heeft.

Het gebruik van NSAID's kan de symptomen van een infectie maskeren.

Kinderen en jongeren tot 18 jaar

Er is een risico op verstoorde nierfunctie bij uitgedroogde jongeren.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast Albert Heijn Ibuprofen liquid caps nog andere geneesmiddelen, heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

Sommige geneesmiddelen en behandelingen kunnen een wisselwerking met elkaar aangaan, dat wil zeggen elkaars werking en bijwerkingen versterken of verzwakken.

Neem Albert Heijn Ibuprofen liquid caps niet in als u:

- Andere NSAID pijnstillers gebruikt (inclusief COX-2 remmers).
- Per dag meer dan 75 mg aspirine gebruikt.

Albert Heijn Ibuprofen liquid caps kan invloed hebben op of beïnvloed worden door andere medicijnen. Bijvoorbeeld:

- bloedverdunders (dat zijn middelen die bloedstolling voorkomen, bijvoorbeeld aspirine/acetylsalicylzuur, warfarine, ticlopidine)
- bloeddrukverlagers (ACE-remmers zoals captopril, bèta-blokkers zoals atenolol, angiotensine-II receptor-antagonisten zoals losartan)
- corticosteroiden (ontstekingsremmende geneesmiddelen zoals prednison)
- diuretica (plaspillen, zoals hydrochloorthiazide)
- kaliumsparende diuretica (zoals spironolacton)
- digoxine (een hartversterkend middel)
- fenytoïne (een middel tegen vallende ziekte)
- lithium (een geneesmiddel voor manisch-depressieve psychose en depressie)

| | | | | | |
|----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|-----------------|---------------------|
| Department of Regulatory Affairs | Date: 2018-04 | Authorisation | Case manager: AO | Rev. 2.4 | Approved MEB |
|----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|-----------------|---------------------|

| | | |
|---|------------|--|
| Albert Heijn B.V., Zaandam, The Netherlands | | Module 1 Administrative information and prescribing information |
| Albert Heijn Ibuprofen liquid caps 400 mg, capsules, zacht | RVG 117587 | |
| ibuprofen | | |
| 1.3.1.3 Package leaflet | | 1.3.1.3 / 4 van 9 |

- methotrexaat (geneesmiddel tegen reuma, psoriasis en sommige kankersoorten)
- zidovudine (geneesmiddel voor de behandeling van HIV)
- middelen die de samenklontering van de bloedplaatjes remmen zoals clopidogrel
- selectieve serotonineheropnameremmers (SSRI's), zoals fluoxetine, een geneesmiddel tegen depressies
- ciclosporine of tacrolimus (geneesmiddelen die het immuunsysteem onderdrukken)
- chinolonantibiotica (geneesmiddelen voor de behandeling van verschillende soorten infecties, zoals ciprofloxacine)
- probenecide en sulfinpyrazon (geneesmiddelen tegen jicht)
- moclobemide (geneesmiddel tegen depressie)
- aminoglycosides (een antibioticum)
- cholestyramine (geneesmiddel om het cholesterolgehalte in het bloed te verlagen)
- sulfonyleureumderivaten (geneesmiddelen tegen diabetes)

Enkele andere geneesmiddelen kunnen ook invloed hebben op of beïnvloed worden door de behandeling met Albert Heijn Ibuprofen liquid caps. Raadpleeg daarom altijd uw arts of apotheker voordat u Albert Heijn Ibuprofen liquid caps in combinatie met andere medicijnen gebruikt.

Waarop moet u letten met eten, drinken en alcohol?

Albert Heijn Ibuprofen liquid caps kan op een lege maag worden ingenomen. Echter een klein aantal personen kunnen lichte maagklachten krijgen na inname van dit geneesmiddel. Als u lichte maagklachten heeft, dan wordt het aangeraden om dit geneesmiddel met voedsel of melk in te nemen, om maagklachten te voorkomen.

Sommige bijwerkingen, zoals bijwerkingen van het maag-darmstelsel, kunnen eerder optreden wanneer alcohol wordt gebruikt tijdens het gebruik van Albert Heijn Ibuprofen liquid caps.

Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid

Informeer uw arts als u zwanger wordt tijdens het gebruik van Albert Heijn Ibuprofen liquid caps.

Als u in de eerste zes maanden van de zwangerschap bent, raadpleeg dan eerst uw arts of apotheker voordat u Albert Heijn Ibuprofen liquid caps inneemt.

Gebruik dit geneesmiddel niet als u in de laatste drie maanden van de zwangerschap bent, aangezien het mogelijk is dat het problemen met het ongeboren kind of complicaties tijdens de bevalling kan veroorzaken.

Albert Heijn Ibuprofen liquid caps wordt uitgescheiden in de moedermelk, maar mag tijdens de borstvoeding in de aanbevolen dosis worden gebruikt gedurende een zo kort mogelijke tijd.

Dit product behoort tot een groep geneesmiddelen (NSAID's) die de vruchtbaarheid bij vrouwen kan verminderen. Dit effect is omkeerbaar wanneer het gebruik van het geneesmiddel wordt gestopt. Het is niet waarschijnlijk dat dit geneesmiddel uw kansen om zwanger te worden beïnvloedt als het af en toe wordt gebruikt, echter raadpleeg uw arts voordat u het gaat gebruiken als u problemen heeft om zwanger te worden.

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Bestuur geen voertuig en gebruik geen machines als de volgende verschijnselen bij u optreden: duizeligheid, sufheid, draaiduizeligheid of problemen met het zien.

Belangrijke informatie over enkele stoffen in Albert Heijn Ibuprofen liquid caps 400 mg capsules, zacht

| | | | | | |
|----------------------------------|---------------|---------------|------------------|----------|--------------|
| Department of Regulatory Affairs | Date: 2018-04 | Authorisation | Case manager: AO | Rev. 2.4 | Approved MEB |
|----------------------------------|---------------|---------------|------------------|----------|--------------|

| | | |
|---|------------|--|
| Albert Heijn B.V., Zaandam, The Netherlands | | Module 1 Administrative information and prescribing information |
| Albert Heijn Ibuprofen liquid caps 400 mg, capsules, zacht | RVG 117587 | |
| ibuprofen | | |
| 1.3.1.3 Package leaflet | | 1.3.1.3 / 5 van 9 |

Dit geneesmiddel bevat sorbitol. Als uw arts u heeft verteld dat u bepaalde suikers niet kunt verdragen, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

3. HOE NEEMT U DIT MIDDEL IN?

Neem dit geneesmiddel altijd precies in zoals beschreven in deze bijsluiter. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Voor oraal gebruik en uitsluitend voor kortdurend gebruik.

Gebruik de laagste effectieve dosis voor de kortst mogelijke tijd die nodig is om de symptomen te verlichten.

Volwassenen: Raadpleeg uw arts als u zich niet beter voelt na 5 dagen bij pijn of na 3 dagen bij koorts en migraine, of als de klachten verergeren.

Adolescenten (12 – 18 jaar oud): Indien adolescenten dit geneesmiddel langer dan 3 dagen nodig hebben of indien de symptomen verergeren, dient een arts geraadpleegd te worden.

Albert Heijn Ibuprofen liquid caps moet zonder te kauwen met voldoende water worden ingenomen. Albert Heijn Ibuprofen liquid caps mag niet worden gebruikt door adolescenten met een lichaamsgewicht lager dan 40 kg en door kinderen.

De aanbevolen dosis voor volwassenen en adolescenten zwaarder dan 40 kg (12 jaar of ouder) is: 1 capsule (400 mg ibuprofen) tot maximaal drie capsules per dag, indien nodig. Neem alleen een zodanige hoeveelheid capsules om uw symptomen te verlichten en laat minstens 6 uur tussen elke inname.

Neem niet meer dan drie capsules (1200 mg ibuprofen) in binnen 24 uur.

Heeft u te veel van dit middel ingenomen?

Wanneer u meer Albert Heijn Ibuprofen liquid caps ingenomen heeft dan toegestaan of als een kind per ongeluk dit geneesmiddel ingenomen heeft, moet u onmiddellijk naar uw arts of de dichtstbijzijnde spoedafdeling gaan en de verpakking van uw geneesmiddel en deze bijsluiter meenemen. De mogelijke verschijnselen zijn misselijkheid, buikpijn, overgeven (kan bloedbraken zijn), hoofdpijn, oorsuizen, verwardheid en trillende oogbewegingen. Bij hoge doseringen werden slaperigheid, pijn op de borst, hartkloppingen, verminderd bewustzijn, aanvallen van bewusteloosheid met spiertrekkingen (convulsies, vooral bij kinderen), zwakte en duizeligheid, bloed in urine, het koud aanvoelen van het lichaam en ademhalingsproblemen gemeld.

Andere mogelijke verschijnselen zijn braken met bruin gruis (zoals gemalen koffie), diarree, sufheid, desoriëntatie, een verhoogd kaliumgehalte in het bloed (hyperkaliëmie) en zelden bewusteloosheid.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

| | | | | | |
|-------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|-----------------|---------------------|
| Department of Regulatory Affairs | Date: 2018-04 | Authorisation | Case manager: AO | Rev. 2.4 | Approved MEB |
|-------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|-----------------|---------------------|

| | | |
|---|------------|--|
| Albert Heijn B.V., Zaandam, The Netherlands | | Module 1 Administrative information and prescribing information |
| Albert Heijn Ibuprofen liquid caps 400 mg, capsules, zacht | RVG 117587 | |
| ibuprofen | | |
| 1.3.1.3 Package leaflet | | 1.3.1.3 / 6 van 9 |

Als u van één van de volgende symptomen last heeft op enig moment gedurende de behandeling, STOP dan met de inname van dit geneesmiddel en *zoek onmiddellijk medische hulp*:

- bloed in uw ontlasting
- zwarte, teerachtige ontlasting
- braken van bloed of donkere deeltjes die op gemalen koffie lijken
- onverklaarbaar gehijg, kortademigheid, huiduitslag (wat ernstig kan zijn, inclusief blaren of huidschilders), jeuk of blauwe plekken, licht in het hoofd, verhoogde hartslag of vochtretentie bijv. gezwollen enkels, niet genoeg plassen
- stijve nek, hoofdpijn, misselijkheid, braken, koorts en desoriëntatie
- zwelling in het gezicht

STOP met de inname van het geneesmiddel en *vertel uw arts als u*:

- maagdarfstoornissen of zuurbranden heeft
- buikpijn of andere maagdarmlachten heeft
- gelige ogen en/of een gelige huid heeft
- hevige zere keel heeft met hoge koorts of onverklaarbare bloeding, blauwe plekken en vermoeidheid.

Bijwerkingen zijn gerangschikt naar frequentie waarmee ze optreden. Hierbij worden de volgende begrippen gebruikt:

| | |
|-------------|---|
| zeer vaak | meer dan 1 op de 10 gebruikers |
| vaak | 1 tot 10 op de 100 gebruikers |
| soms | 1 tot 10 op de 1000 gebruikers |
| zelden | 1 tot 10 op de 10.000 gebruikers |
| zeer zelden | minder dan 1 op de 10.000 gebruikers |
| niet bekend | kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald |

De volgende bijwerkingen kunnen optreden.

Infecties

Zeer zelden: verergering van infectiegerelateerde ontstekingen (bijv. necrotiserende fasciitis), virale hersenvliesontsteking met nekstijfheid, hoofdpijn, misselijkheid, braken, koorts of bewustzijnsvermindering. Patiënten met auto-immuunziekten (lupus, gemengde bindweefselziekte) lijken hiervoor gevoelig te zijn.

Bloedaandoeningen

Zeer zelden: problemen met de aanmaak van bloedcellen – de eerste tekenen hiervan zijn: koorts, keelpijn, oppervlakkige mondzweren, griepachtige symptomen, ernstige uitputting, neus- en huidbloeding. Als dit bij u optreedt moet u onmiddellijk met de behandeling stoppen en een arts raadplegen.

Problemen van het afweersysteem

Soms: overgevoelighedsreacties met galbulten en jeuk, evenals astma-aanvallen. Stop met de inname van Albert Heijn Ibuprofen liquid caps en waarschuw onmiddellijk uw arts.

Zeer zelden: ernstige overgevoelighedsreacties – tekenen hiervan kunnen zijn: zwelling van gezicht, tong en keel, kortademigheid, versnelde hartslag, ernstige shock. Als één van deze symptomen bij u optreedt, wat zelfs bij het eerste gebruik kan gebeuren, is onmiddellijke hulp van een arts noodzakelijk.

Psychische stoornissen

Zeer zelden: psychotische reacties, depressie, zenuwachtigheid.

| | | | | | |
|-------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|-----------------|---------------------|
| Department of Regulatory Affairs | Date: 2018-04 | Authorisation | Case manager: AO | Rev. 2.4 | Approved MEB |
|-------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|-----------------|---------------------|

| | | |
|---|------------|--|
| Albert Heijn B.V., Zaandam, The Netherlands | | Module 1 Administrative information and prescribing information |
| Albert Heijn Ibuprofen liquid caps 400 mg, capsules, zacht | RVG 117587 | |
| ibuprofen | | |
| 1.3.1.3 Package leaflet | | 1.3.1.3 / 7 van 9 |

Zenuwstelselaandoeningen

Soms: hoofdpijn, duizeligheid, slaperigheid, onrust (agitatie), prikkelbaarheid en vermoeidheid.

Oogaandoeningen

Soms: problemen met het zien.

Oor- en evenwichts-aandoeningen

Zelden: oorsuizen (tinnitus).

Hartaandoeningen

Zeer zelden: hartkloppingen, hartfalen, hartinfarct.

Bloedvataandoeningen

Zeer zelden: hoge bloeddruk van de slagaders.

Ademhalingsstelsel-, borstkas- en mediastinumaandoeningen

Zeer zelden: astma, kortademigheid en piepende ademhaling.

Maag- en darmstoornissen

Vaak: maagklachten, zoals brandend maagzuur, maagpijn en misselijkheid, diarree, braken, winderigheid en verstopping, licht bloedverlies in maag en/of darmen dat in uitzonderlijke gevallen bloedarmoede kan veroorzaken.

Soms: perforatie of maagdarmbloeding, zwarte ontlasting en bloedbraken, verergering van een bestaande darmziekte (colitis ulcerosa of de ziekte van Crohn), gastritis.

Zeer zelden: slokdarmontsteking, ontsteking van de alvleesklier, vorming van diafragma-achtige vernauwingen in de darm.

Leverstoornissen

Zeer zelden: leverbeschadiging (één van de eerste tekenen kan huidverkleuring zijn), acute leverontsteking.

Huidaandoeningen

Soms: verschillende soorten huiduitslag.

Zeer zelden: ernstige vormen van huidreacties waaronder huiduitslag met roodheid en blaarvorming, Stevens-Johnson syndroom en afsterven van weefsel. In uitzonderlijke gevallen kunnen ernstige huidinfectie en weefsel complicaties optreden tijdens waterpokken (varicella).

Niet bekend: Een ernstige huidreactie, bekend als het DRESS-syndroom, kan optreden. Verschijnselen van DRESS zijn: huiduitslag, koorts, zwelling van de lymfeknopen en toename van eosinofielen (een soort witte bloedcellen).

Nierstoornissen

Zelden: pijn in de zij en/of buik, bloed in de urine en koorts kunnen tekenen zijn van nierbeschadiging (papilnecrose). Een verhoogde ureumconcentratie in het bloed kan zelden optreden.

Zeer zelden: minder plassen dan normaal, zwelling (oedeem) en troebele urine (nefrotisch syndroom); inflammatoire nierziekte (interstitiële nefritis) die kan leiden tot acuut nierfalen.

Onderzoeken

Zeer zelden: lage hemoglobine concentraties in het bloed (anemie).

Geneesmiddelen als Albert Heijn Ibuprofen liquid caps kunnen worden geassocieerd met een klein verhoogd risico op hartaanval ("hartinfarct") of beroerte.

| | | | | | |
|-------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|-----------------|---------------------|
| Department of Regulatory Affairs | Date: 2018-04 | Authorisation | Case manager: AO | Rev. 2.4 | Approved MEB |
|-------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|-----------------|---------------------|

| | | |
|---|------------|--|
| Albert Heijn B.V., Zaandam, The Netherlands | | Module 1 Administrative information and prescribing information |
| Albert Heijn Ibuprofen liquid caps 400 mg, capsules, zacht | RVG 117587 | |
| ibuprofen | | |
| 1.3.1.3 Package leaflet | | 1.3.1.3 / 8 van 9 |

Het melden van bijwerkingen

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb, website: www.lareb.nl. Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

5. HOE BEWAART U DIT MIDDEL?

Bewaren beneden 25 °C.

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op het doosje. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Spoel geneesmiddelen niet door de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

6. INHOUD VAN DE VERPAKKING EN OVERIGE INFORMATIE

Welke stoffen zitten er in dit middel?

De werkzame stof in dit middel is ibuprofen.
Elke capsule bevat 400 mg ibuprofen.

De andere stoffen in dit middel zijn:

Macrogol 600
Kaliumhydroxide
Gezuiverd water

Capsule wand

Gelatine
Vloeibaar sorbitol, gedeeltelijk gedehydrateerd (E420)

Inkt

Opacode WB zwart NS-78-17821 *

*De inkt bevat: zwart ijzeroxide, HPMC 2910/Hypromellose 6cP

Hoe ziet Albert Heijn Ibuprofen liquid caps 400 mg capsules, zacht eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

Albert Heijn Ibuprofen liquid caps 400 mg capsules, zacht zijn transparante, ovale zachte gelatine capsules.

Albert Heijn Ibuprofen liquid caps 400 mg capsules, zacht zijn beschikbaar in PVC/PE/PVdC/Al blisters en in PVC/PE/PVdC/Al/PET blisters.

De verpakkingsgroottes zijn of 4, 10, 12, 15, 16 en 20 capsules.

| | | | | | |
|-------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|-----------------|---------------------|
| Department of Regulatory Affairs | Date: 2018-04 | Authorisation | Case manager: AO | Rev. 2.4 | Approved MEB |
|-------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|-----------------|---------------------|

| | | |
|---|------------|--|
| Albert Heijn B.V., Zaandam, The Netherlands | | Module 1 Administrative information and prescribing information |
| Albert Heijn Ibuprofen liquid caps 400 mg, capsules, zacht | RVG 117587 | |
| ibuprofen | | |
| 1.3.1.3 Package leaflet | | 1.3.1.3 / 9 van 9 |

Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Albert Heijn B.V.
 Provincialeweg 11
 1506 MA Zaandam
 Nederland

Fabrikant

Patheon Softgels B.V.
 De Posthoornstraat 7
 5048 AS Tilburg
 Nederland

Centrafarm Services B.V.
 Nieuwe Donk 9
 4879 AC Etten-Leur
 Nederland

In het register ingeschreven onder

RVG 117587, Albert Heijn Ibuprofen liquid caps 400 mg capsules, zacht.

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in april 2018.

| | | | | | |
|-------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|-----------------|---------------------|
| Department of Regulatory Affairs | Date: 2018-04 | Authorisation | Case manager: AO | Rev. 2.4 | Approved MEB |
|-------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|-----------------|---------------------|