

Ringer-oplossing

Lees deze bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel.

- Bewaar deze bijsluiter, het kan nodig zijn om deze nogmaals door te lezen.
 - Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Inhoud van deze bijsluiter

1. Wat is Ringer-oplossing en waarvoor wordt het gebruikt?
2. Wat u moet weten voordat u Ringer-oplossing gebruikt
3. Hoe wordt Ringer-oplossing gebruikt?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe wordt Ringer-oplossing bewaard?

RINGER-OPLOSSING– Infusievloeistof

Ringer-oplossing is beschikbaar in glas en in kunststofzakken.

1000 ml bevat:

Natriumchloride	8,6 g
Kaliumchloride	0.3 g
Calciumchloride.2 H ₂ O	0.33 g
Theoretische osmolariteit	309 mosmol/l

Overige bestanddelen: water voor injecties.

De registratiehouder van Ringer-oplossing is:

Fresenius Kabi Nederland B.V.
Amersfoortseweg 10 E
3712BC Huis ter Heide

Ringer-oplossing is ingeschreven onder nummer RVG 52600

1. WAT IS RINGER-OPLOSSING EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT?

Ringer-oplossing is een infuusvloeistof die bepaalde zouten zoals natriumchloride, kaliumchloride en calciumchloride bevat.

Ringer-oplossing infuusvloeistof wordt gebruikt om verlies van vocht en zout in het lichaam te herstellen.

2. WAT MOET U WETEN VOORDAT U RINGER-OPLOSSING TOEGEDIEND KRIJGT

Ringer-oplossing moet niet gebruikt worden wanneer u last heeft van:

In de volgende situaties moet Ringer-oplossing infuusvloeistof niet gebruikt worden.

- Overvulling van de weefsels.
- Vochtverlies dat samengaat met hoge zoutconcentraties in het bloed
- Hoge kalium concentraties in het bloed
- Hoge natrium concentraties in het bloed
- Ernstig verhoogde bloeddruk
- Sterk verminderde functie van het hart of de nieren
- Hoge chloride concentraties in het bloed

Ringer-oplossing

- Verzuring van het bloed

Extra voorzichtigheid met Ringer-oplossing is op zijn plaats bij:

Als er sprake is van een lichte tot matige verhoging van de bloeddruk moet Ringer-oplossing met voorzichtigheid worden toegediend.

Dit geldt ook bij een neiging tot hartfalen, een lichte tot matige vermindering van de werking van de nier, bepaalde ademhalingsproblemen, acute uitdroging, hittekrampen en bij gelijktijdige behandeling met corticosteroiden

Meestal zal er een controle van uw bloed en van de vochtbalans plaatsvinden.

Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor U van toepassing is, of dat in het verleden geweest is.

Zwangerschap en borstvoeding

Dit product mag tijdens de zwangerschap en het geven van borstvoeding worden toegediend.

Gebruik van Ringer-oplossing in combinatie met andere geneesmiddelen

Ringer-oplossing bevat natrium, kalium en calciumzouten. Van een aantal geneesmiddelen is bekend dat ze kunnen leiden tot extra ophoping van deze zouten.

De voornaamste voorbeelden hiervan zijn:

Voor natrium: Ontstekingsremmende geneesmiddelen die gebruikt worden bij bijv. reumatische aandoeningen of spierpijn.

Voor kalium: Bepaalde plasmiddelen die de kalium concentraties in het bloed verhogen.

Er zijn nog talrijke andere geneesmiddelen die een dergelijk effect hebben zodat het erg belangrijk is uw arts te informeren over de geneesmiddelen die U gebruikt.

Als U hartglycosiden gebruikt kan calcium uit Ringer-oplossing het effect hiervan op het hart beïnvloeden.

Informeer uw arts of apotheker wanneer u andere geneesmiddelen gebruikt of heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt verkrijgen.

3. HOE WORDT RINGER-OPLOSSING GEBRUIKT?

Ringer-oplossing wordt via een infuus direct in de bloedbaan gebracht.

De hoeveelheid die er per dag mag worden toegediend hangt af van uw behoefte aan vocht en zouten. Uw arts zal deze hoeveelheid zorgvuldig bepalen.

4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN

Net als bij elke toediening van alle geneesmiddelen via een ader kunnen er aderontstekingen optreden.

Verder kan er overvulling van de weefsels optreden. In dit geval kan zich vocht in de weefsels en longen ophopen en kan hartfalen worden veroorzaakt.

Verder kan de chloride concentratie in het bloed verhoogd worden.

5. Hoe wordt Ringer-oplossing bewaard?

Ringer-oplossing

Niet boven 25 °C bewaren. Niet invriezen.

Uiterste gebruiksdatum:

Gebruik Ringer-oplossing niet na de op de verpakking vermelde datum achter “Niet te gebruiken na:”.

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in september 2018.