

## BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER

**AdreView, Iobenguane (<sup>123</sup>I) Injection, oplossing voor injectie 74 MBq/ml**  
(in deze bijsluiter AdreView genoemd)

[<sup>123</sup>I]Iobenguaan

**Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel krijgt toegediend want er staat belangrijke informatie in voor u**

- Bewaar deze bijsluiter. Misschien hebt u hem later weer nodig
- Hebt u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts
- Krijgt u last van bijwerkingen? Neem dan contact op met uw arts. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. Zie rubriek 4.

### Inhoud van deze bijsluiter

1. Wat is AdreView en waarvoor wordt het gebruikt?
2. Wanneer mag u AdreView niet worden toegediend of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe wordt AdreView toegediend
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u AdreView
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

### **1. Wat is AdreView en waarvoor wordt het gebruikt ?**

Dit geneesmiddel is uitsluitend voor diagnostisch gebruik. Het wordt enkel gebruikt om een ziekte te helpen identificeren.

AdreView is een 'radiofarmacon'. Het wordt voorafgaand aan een scan toegediend en helpt een speciale camera om binnenin een deel van uw lichaam te kijken.

- Het bevat de werkzame stof 'Iobenguaan'.
- Als het middel eenmaal is geïnjecteerd, kan het vanaf de buitenkant van uw lichaam worden gezien door een speciale camera in het scantoeel.
- De scan kan uw arts helpen om bepaalde soorten tumoren op te sporen in de bijnier of schildklier, of om na te gaan hoe goed een tumor op een behandeling reageert.
- Andere mensen krijgen dit middel toegediend voor een scan om te achterhalen hoe goed hun hart functioneert.

Uw arts of verpleegkundige zal u uitleggen welk deel van uw lichaam zal worden gescand.

### **2. Wanneer mag u AdreView niet worden toegediend of moet u er extra voorzichtig mee zijn?**

#### **Wanneer mag u dit middel niet toegediend krijgen?**

- U bent allergisch (overgevoelig) bent voor Iobenguaan of één van de andere bestanddelen (zie rubriek 6).
- Niet gebruiken bij te vroeg geboren kinderen of pasgeborenen

Gebruik AdreView niet als het bovenstaande op u van toepassing is. Overleg met uw arts of verpleegkundige als u niet zeker bent.

### **Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?**

Neem contact op met uw arts voordat u dit middel toegediend krijgt wanneer u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen. Dit omvat eveneens kruidenpreparaten. Sommige geneesmiddelen kunnen namelijk de werking van AdreView verstoren.

Informeer uw arts of verpleegkundige vóór de scan als u geneesmiddelen van onderstaande types gebruikt. Deze geneesmiddelen kunnen namelijk de resultaten van uw scan beïnvloeden:

- bepaalde middelen tegen een te hoge bloeddruk (calciumkanaalblokkers), zoals diltiazem, nifedipine of verapamil.
- zogenaamde tricyclische antidepressiva zoals amitryptiline of imipramine.
- 'sympathomimetica, voorkomend in neusdruppels (bij een verstopte neus) zoals fenylefrine, efedrine, pseudo-efedrine of fenylpropanolamine.
- reserpine (wordt gebruikt om psychische problemen of hoge bloeddruk te behandelen).
- labetalol (wordt gebruikt om hoge bloeddruk te behandelen).
- fenothiazine (wordt gebruikt om psychische problemen te behandelen).
- cocaïne.

Raadpleeg uw arts of verpleegkundige voordat u AdreView gebruikt als u niet zeker weet of het bovenstaande op u van toepassing is.

### **Zwangerschap en borstvoeding**

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding?

Neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel toegediend krijgt

Uw arts zal AdreView uitsluitend gebruiken als hij van mening is dat de voordelen groter zijn dan de risico's.

U mag geen borstvoeding geven als u AdreView krijgt. Er kunnen namelijk kleine hoeveelheden 'radioactiviteit' in de moedermelk terechtkomen. Als u borstvoeding geeft, kan uw arts mogelijk wachten tot u hiermee gestopt bent voordat hij AdreView toedient. Als wachten niet mogelijk is, zal uw arts u vragen om:

- de borstvoeding gedurende 3 dagen stop te zetten, en
- flesvoeding aan uw kind te geven, en
- de moedermelk af te kolven en weg te gooien.

Uw arts zal u zeggen wanneer u opnieuw borstvoeding mag geven.

### **Rijvaardigheid en het gebruik van machines**

Toediening voor gebruik zoals in de bijsluiter heeft geen invloed op de rijvaardigheid.

### **AdreView bevat:**

- Benzylalcohol. Deze stof kan giftige en allergische reacties veroorzaken bij zuigelingen en kinderen jonger dan 3 jaar.
- 4.23 mg natrium per ml. Dit geneesmiddel bevat minder dan 1 mmol natrium (23 mg) per dosis, d.w.z. in wezen 'natriumvrij'

Raadpleeg uw arts als u vragen hebt.

### 3. Hoe wordt AdreView toegediend

AdreView wordt aan u toegediend door een speciaal opgeleid en gekwalificeerd persoon.

- AdreView wordt altijd gebruikt in een ziekenhuis of kliniek.
- Uw arts zal u vragen om ten minste één uur vóór de toediening van AdreView een ander geneesmiddel in te nemen. Dit middel verhindert de ophoping van radioactiviteit in uw schildklier.
- Men zal u alles vertellen wat u moet weten om het geneesmiddel op een veilige manier te gebruiken.

Uw arts beslist welke dosis het meest geschikt is voor u.

#### **De aanbevolen dosering is:**

- een enkele injectie toegediend over een periode van een aantal minuten.

Uw scan zal gewoonlijk op dezelfde dag of op de dag na de injectie worden uitgevoerd en kan mogelijk herhaald worden.

#### **Hebt u te veel van dit middel toegediend gekregen?**

AdreView wordt in een ziekenhuis of kliniek gegeven door een speciaal daarvoor opgeleide en gekwalificeerde persoon. Het is niet waarschijnlijk dat u teveel krijgt.

Als u nog vragen heeft over het gebruik van dit geneesmiddel, vraag dan uw arts of verpleegkundige.

### 4. Mogelijke bijwerkingen

Zoals alle geneesmiddelen kan AdreView bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt.

Dit radiofarmacon zal lage hoeveelheden ioniserende straling afgeven, wat gepaard gaat met een zeer klein risico op kanker en erfelijke afwijkingen.

#### **Allergische reacties (overgevoeligheid)**

Als u een allergische reactie ervaart terwijl u in het ziekenhuis of de kliniek bent voor uw scan, vertel dit dan onmiddellijk aan de arts of verpleegkundige. Symptomen hiervan zijn:

- Galbulten, blozen,
- opzwellen van het gezicht,
- moeilijkheden bij het ademen.
- misselijkheid,
- koude rillingen.

Wanneer één van deze bijwerkingen optreedt nadat u het ziekenhuis of de kliniek hebt verlaten, moet u onmiddellijk naar de spoedafdeling van het dichtstbijzijnde ziekenhuis gaan of worden gebracht.

#### **Andere bijwerkingen zijn**

Als AdreView te snel wordt geïnjecteerd, kunt u de volgende bijwerkingen ervaren. Deze verdwijnen binnen één uur.

- snelle of onregelmatige hartslag,
- moeilijkheden bij het ademen,
- zich warmer voelen dan normaal,
- buikkrampen,
- hoge bloeddruk. Verschijnselen hiervan kunnen hoofdpijn en gezichtsveranderingen (gezichtsstoornis) zijn.

### Het melden van bijwerkingen

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of verpleegkundige. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb; website: [www.lareb.nl](http://www.lareb.nl). Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

## **5. Hoe bewaart u AdreView**

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Bewaren beneden 25°C. Niet in de vriezer bewaren. Eenmaal geopend, bewaren in een koelkast bij 2°C-8°C en binnen één werkdag gebruiken. Opslag dient te geschieden in de originele loodcontainer of in gelijkwaardige afscherming.

Op het productetiket vindt u informatie betreffende de juiste bewaaromstandigheden en de vervaldatum voor de partij. Het ziekenhuispersoneel zal ervoor zorgen dat het product correct wordt bewaard en vernietigd en dat het niet wordt gebruikt na de vervaldatum die op het etiket is vermeld.

## **6. Inhoud van de verpakking en overige informatie**

### **Welke stoffen zitten er in dit middel?**

- Het werkzame bestanddeel is [<sup>123</sup>I]jobenguaan. Elke ml AdreView bevat 74 MBq (Megabecquerel – de eenheid waarin radioactiviteit wordt gemeten) [<sup>123</sup>I]jobenguaan op een vast moment.
- De andere bestanddelen zijn benzylalcohol, 3-jodobenzylguanidine, natriumdiwaterstoffosfaat dihydraat, dinatriumwaterstoffosfaat dihydraat en water voor injecties.

### **Hoe ziet AdreView eruit en wat is de inhoud van de verpakking**

AdreView wordt geleverd in een enkele glazen flacon die een injectieoplossing bevat.

### **Houder van de vergunning voor het in de handel brengen**

GE Healthcare B.V.  
De Rondom 8  
5612 AP Eindhoven  
Nederland

### **Fabrikant**

GE Healthcare B.V.  
De Rondom 8  
5612 AP Eindhoven  
Nederland

### **Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen**

RVG 57689

**Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in maart 2016**