

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER

Nestosyl, hydrofobe crème

Pramocaïnehydrochloride 10 mg/g, zinkoxide 100 mg/g

Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken, want er staat belangrijke informatie in voor u:

Dit geneesmiddel kunt u zonder recept krijgen. Maar gebruik het wel zorgvuldig, dan bereikt u het beste resultaat.

- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw apotheker.
- Wordt uw klacht na een aantal dagen niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts.
- Krijgt u last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
- Wordt uw klacht na enkele dagen niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts.

Inhoud van deze bijsluiter

1. Wat is Nestosyl en waarvoor wordt dit middel gebruikt?
2. Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe gebruikt u dit middel?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u dit middel?
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

1. WAT IS NESTOSYL EN WAARVOOR WORDT DIT MIDDEL GEBRUIKT?

Pramocaïnehydrochloride werkt lokaal pijn- en jeukstillend. Zinkoxide heeft een dekkende, verkoelende en zwak adstringerende (= samentrekkende) werking. Samenvattend werkt Nestosyl pijn- en jeukverlichtend.

Nestosyl kan worden gebruikt ter verlichting van plaatselijke jeuk, insectenbeten en oppervlakkige schaafwonden.

2. WANNEER MAG U DIT MIDDEL NIET GEBRUIKEN OF MOET U ER EXTRA VOORZICHTIG MEE ZIJN?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

U bent allergisch voor een van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Nestosyl is niet geschikt voor toepassing op slijmvliezen. Langdurige toepassing op grote huidoppervlakken moeten worden vermeden. Bij grove overdosering bestaat de mogelijkheid van ernstige systemische bijwerkingen ten gevolge van absorptie van pramocaïne. Indien de klachten aanhouden, verergeren of terugkeren uw arts raadplegen. De aangegeven dosering niet overschrijden.

Zwangerschap en borstvoeding

Dit geneesmiddel kan, voor zover bekend, zonder gevaar voor de vrucht of de zuigeling, overeenkomstig het voorschrift worden gebruikt in de zwangerschap en tijdens borstvoeding.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Beïnvloeding van deze functies valt niet te verwachten.

Nestosyl bevat o.a. arachide-olie (pindaolie), soja-lecithine en wolvet.

Dit geneesmiddel niet gebruiken indien u overgevoelig bent voor pinda's en/of soja. Wolvet kan plaatselijke huidreacties veroorzaken (bijv. contactdermatitis).

3. HOE GEBRUIKT U DIT MIDDEL?

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Op de beschadigde huid brengt men een dikke laag Nestosyl crème aan. Vervolgens wordt de betreffende plek - zo nodig - afgedekt met verbandgaas of een pleister. Deze behandeling wordt één- à tweemaal per dag herhaald. Bij plaatselijke kortdurende jeuk of insectenbeten brengt men enige malen per dag een dunne laag crème aan.

4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Huid- en onderhuidaandoeningen:

Frequentie: niet bekend (kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald).

Contactallergie of irritatie door pramocaïne of een van de andere bestanddelen van de basis kan voorkomen.

Het melden van bijwerkingen

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb (website: www.lareb.nl). Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

5. HOE BEWAART U DIT MIDDEL?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Bewaren beneden 25 °C. Niet in de vriezer bewaren.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op het doosje na "niet te gebruiken na" en op de tube na "Exp". Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum. Na opening van de tube nog 12 maanden houdbaar.

6. INHOUD VAN DE VERPAKKING EN OVERIGE INFORMATIE

Welke stoffen zitten er in dit middel?

- De werkzame stoffen in dit middel zijn: pramocaïnehydrochloride en zinkoxide.
- De andere stoffen in dit middel zijn: benzalkoniumbromide, 8-hydroxychinoline, wolvet, witte vaseline, arachide-olie (pinda-olie), soja-lecithine, gezuiverd water.

Hoe ziet Nestosyl eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

Nestosyl is verpakt in een aluminium tube van 15 of 30 gram. De tube is verpakt in een kartonnen doosje.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Remark Pharma
Industrieweg 24
7949 AK Rogat

Fabrikant
Qualiphar NV
Rijksweg 9
B-2880 Bornem
België

Inschrijving in het Register

In het Register ingeschreven onder RVG 00591

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in februari 2018.