

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker

Norit 200, 200 mg harde capsules geactiveerde kool

Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit medicijn gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor u.

Gebruik dit medicijn altijd precies zoals in deze bijsluiter beschreven of zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld.

- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw apotheker.
- Krijgt u last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
- Wordt uw klacht na 14 dagen niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts.

Inhoud van deze bijsluiter

1. Wat is Norit 200 en waarvoor wordt dit medicijn gebruikt?
2. Wanneer mag u dit medicijn niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe gebruikt u dit medicijn?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u dit medicijn?
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

1. Wat is Norit 200 en waarvoor wordt dit medicijn gebruikt?

De werkzame stof in Norit 200, geactiveerde kool, kan in het maagdarmkanaal aanwezige schadelijke of ongewenste stoffen binden (adsorberen).

Norit 200 wordt gebruikt ter aanvulling van dieetmaatregelen bij acute diarree.

2. Wanneer mag u dit medicijn niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit medicijn niet gebruiken?

- U bent allergisch voor een van de stoffen in dit medicijn. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6 van deze bijsluiter.
- Als u een volledige blokkade in uw darmen heeft.
- Als u last heeft van plotselinge buikpijn en ontstekingen in uw darmen (colitis ulcerosa).

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit medicijn?

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit medicijn gebruikt.

- Als de diarree aanhoudt (met het risico op vochtverlies), neem dan contact op met uw arts. Aanvullend onderzoek kan nodig zijn om de oorzaak vast te stellen.
- Door het gebruik van Norit 200 kan de ontlasting zwart kleuren.

Gebruikt u nog andere medicijnen?

Gebruikt u naast Norit 200 nog andere medicijnen, heeft u dat kort geleden gedaan of gaat u dit misschien binnenkort doen? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor medicijnen waar u geen voorschrift voor nodig heeft.

Het gebruik van geactiveerde kool zal in het algemeen de werking van oraal ingenomen geneesmiddelen verminderen vanwege het werkingsmechanisme. Het effect van furosemide (een diureticum) is sterk verminderd als het gelijktijdig wordt ingenomen met actieve kool.

Gelijktijdig gebruik van geactiveerde kool en orale contraceptiva ('de pil') kan mogelijk de werkzaamheid van de orale contraceptiva verminderen. Een aanvullende methode om zwangerschap te voorkomen is dan aan te raden.

Als u medicijnen gebruikt om uw stoelgang te remmen, is het gebruik van Norit 200 niet aan te raden.

Zwangerschap en borstvoeding

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit medicijn gebruikt. Norit 200 kan, voor zover bekend, zonder enig gevaar voor de vrucht of het kind overeenkomstig het voorschrift worden gebruikt tijdens de zwangerschap en het geven van borstvoeding.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Norit 200 heeft geen invloed op het vermogen om auto te rijden en machines te bedienen.

3. Hoe gebruikt u dit medicijn?

Dosering en wijze van gebruik

De geadviseerde dosering is 3-4 capsules per keer; maximaal 12 capsules per dag. Neem de capsules met water in.

Indien bij u Norit 200 te sterk of onvoldoende werkt, neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Heeft u te veel van dit medicijn gebruikt?

Wanneer u te veel van Norit 200 heeft gebruikt, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker. Na toediening van meerdere zeer hoge doses geactiveerde kool kunnen buikpijn en ernstige verstopping van de ingewanden ontstaan.

Bent u vergeten dit medicijn te gebruiken?

Indien u Norit 200 vergeten bent in te nemen, moet u zo spoedig mogelijk de dosis alsnog innemen. Indien het echter bijna tijd is om de volgende dosis in te nemen, sla dan de gemiste dosis over en ga verder met uw normale doseringsschema. Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen. Neem in geval van twijfel contact op met uw arts of apotheker.

4. Mogelijke bijwerkingen

Zoals elk medicijn kan ook dit medicijn bijwerkingen hebben. Niet iedereen krijgt daarmee te maken. Vaker gemelde bijwerkingen zijn: braken, obstipatie, buikpijn, diarree, misselijkheid, een plotselinge behoefte om te poepen, anale irritatie.

Het melden van bijwerkingen

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook melden via het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb, website: www.lareb.nl. Door bijwerkingen te melden, helpt u ons om meer informatie te krijgen over de veiligheid van dit medicijn.

5. Hoe bewaart u dit medicijn?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen vocht.

Gebruik dit medicijn niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die vindt u op de doos en de blister na "EXP". Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Spoel medicijnen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

Welke stoffen zitten er in dit medicijn?

De werkzame stof in dit medicijn is geactiveerde kool van plantaardige herkomst ('carbo activatus'). De andere stoffen in dit medicijn zijn gelatine, titaniumdioxide (E171) en zwart ijzeroxide (E172).

Hoe ziet Norit 200 eruit en wat zit er in een verpakking?

De capsule is zwart van kleur. Een capsule bevat 200 mg geactiveerde kool. De capsules zijn beschikbaar in blisterverpakkingen met 30 capsules.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Vergunninghouder

Norit Nederland B.V.
Astronaut 34
3824 MJ Amersfoort

Fabrikant

Norit Nederland B.V.
Mr. Ovingkanaal O.Z. 3
7891 EV Klazienaveen

Voor inlichtingen en correspondentie in Nederland

Cooper Consumer Health Nederland B.V.
ProductNL@cooperconsumerhealth.com

In het register ingeschreven onder

Norit 200 is in het register ingeschreven onder RVG 09116

Dit medicijn is geregistreerd in lidstaten van de Europese Economische Ruimte onder de volgende namen:

Denemarken	Aktivt kul "Norit"®
Finland	Carbo Medicinalis®
Nederland	Norit 200®

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in maart 2024