

LEVOTHYROXINENATRIUM 25 MICROGRAM/5 ML TEVA
LEVOTHYROXINENATRIUM 50 MICROGRAM/5 ML TEVA
LEVOTHYROXINENATRIUM 100 MICROGRAM/5 ML TEVA
drank

MODULE I: ALGEMENE GEGEVENS

1.3.1 : Bijsluiter

Datum : 22 oktober 2018

Bladzijde : 1

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER

Levothyroxinenatrium 25 microgram/5ml Teva, drank
Levothyroxinenatrium 50 microgram/5ml Teva, drank
Levothyroxinenatrium 100 microgram/5ml Teva, drank
levothyroxinenatrium

Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor u.

- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
- Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen, want het is alleen aan u voorgeschreven. Het kan schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u.
- Krijgt u last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Inhoud van deze bijsluiter

1. Wat is Levothyroxinenatrium Teva drank en waarvoor wordt dit middel gebruikt?
2. Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe gebruikt u dit middel?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u dit middel?
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

1. WAT IS LEVOTHYROXINENATRIUM TEVA DRANK EN WAARVOOR WORDT DIT MIDDEL GEBRUIKT?

Levothyroxinenatrium Teva drank wordt gebruikt om hypothyreoïdie te behandelen. Dit is een aandoening met een verminderde werking van de schildklier waardoor onvoldoende schildklierhormoon (thyroxine) voor het lichaam wordt aangemaakt.

Dit middel wordt ook gebruikt om schildklierkanker en krop (struma) of struma die samengaat met schildklierontsteking (Hashimoto-thyreïditis) te behandelen. Dit zijn aandoeningen waarbij de schildklier vergroot is. Dit veroorzaakt een zwelling aan de voorkant de hals.

2. WANNEER MAG U DIT MIDDEL NIET GEBRUIKEN OF MOET U ER EXTRA VOORZICHTIG MEE ZIJN?

**LEVOTHYROXINENATRIUM 25 MICROGRAM/5 ML TEVA
LEVOTHYROXINENATRIUM 50 MICROGRAM/5 ML TEVA
LEVOTHYROXINENATRIUM 100 MICROGRAM/5 ML TEVA
drank**

MODULE I : ALGEMENE GEGEVENS

Datum : 22 oktober 2018

1.3.1 : Bijsluiter

Bladzijde : 2

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

- U bent allergisch voor één van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6.
- Als u lijdt aan een aandoening waarbij de bijnier onvoldoende werkt en u niet voldoende bijnierschorsormoon (corticosteroidhormoon) aanmaakt.
- Als u een hartaanval heeft (acuut myocardinfarct), een ontsteking van de hartspier (acute myocarditis) of ontsteking van het hartzakje (acute pericarditis).
- Als u zwanger bent mag u dit geneesmiddel niet innemen in combinatie met andere geneesmiddelen tegen verhoogde werking van de schildklier (hyperthyreoïdie) (zie ook de rubriek over Zwangerschap en borstvoeding).

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt:

- als u aan bepaalde hartaandoeningen lijdt, als u stoornissen heeft in uw bloedsomloop of een verhoogde bloeddruk
- als u lijdt aan een overactieve schildklier (hyperthyreoïdie), een minder werkzame bijnier, suikerziekte (diabetes) of als uw schildklier een tijd minder goed werkte.
- als u verschijnselen heeft van een ernstig geestesziekte waarbij de controle over het eigen denken, gedrag en handelen gestoord is; ook is het contact met de werkelijkheid gestoord (psychotische aandoening) (mogelijk wordt u meer gecontroleerd en wordt uw dosering aangepast)
- als u epilepsie (epileptische aanvallen) heeft. Epileptische aanvallen zijn zeer zelden gemeld wanneer levothyroxine therapie wordt gestart
- als u start of stopt met het gebruik van orlistat, of de behandeling met orlistat verandert (geneesmiddel voor de behandeling van obesitas, mogelijk wordt u meer gecontroleerd en wordt uw dosering aangepast).

Kinderen

Tijdens de eerste maanden van behandeling kan het voorkomen dat haar voor een deel uitvalt. Dit effect is vaak tijdelijk en het haar groeit vaak daarna weer terug.

Veel voorzichtigheid is nodig wanneer levothyroxine wordt gestart bij te vroeg geboren pasgeborenen met een laag geboortegewicht. Doordat die weinig adrenaline aanmaken, kan een sterke daling van de bloedsomloop plaatsvinden (circulatoire collaps) (zie rubriek 4. "mogelijke bijwerkingen").

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast Levothyroxinenatrium Teva drank nog andere geneesmiddelen, heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

LEVOTHYROXINENATRIUM 25 MICROGRAM/5 ML TEVA
LEVOTHYROXINENATRIUM 50 MICROGRAM/5 ML TEVA
LEVOTHYROXINENATRIUM 100 MICROGRAM/5 ML TEVA
drank

MODULE I: ALGEMENE GEGEVENS

Datum : 22 oktober 2018

1.3.1 : Bijsluiter

Bladzijde : 3

Levothyroxine kan een wisselwerking hebben met bepaalde andere geneesmiddelen en sommige geneesmiddelen kunnen een effect op levothyroxine hebben. Vertel het uw arts of apotheker vooral als u een van de volgende geneesmiddelen gebruikt:

- Bepaalde geneesmiddelen tegen bloedstolling (bijvoorbeeld warfarine).
- Bepaalde geneesmiddelen tegen neerslachtigheid (depressie) (bijvoorbeeld sertraline, imipramine, amitriptyline)
- Bepaalde geneesmiddelen tegen epilepsie (bijvoorbeeld fenytoïne, fenobarbital, carbamazepine)
- Geneesmiddelen die gebruikt worden bij suikerziekte (diabetes).
- Rifampicine (tegen ontstekingen door bacteriën of virussen (infecties), in het bijzonder bij tuberculose)
- Digoxine of amiodaron (voor uw hart)
- Propranolol (tegen verhoogde bloeddruk), lovastatine (tegen verhoogde cholesterolspiegels) of fenylbutazon of Aspirine (ontstekingsremmende middelen)
- Bepaalde vrouwelijke geslachtshormonen (Oestrogenen), oestrogeenbevattende geneesmiddelen en via de mond in te nemen middelen om zwangerschap te voorkomen (orale anticonceptiemiddelen), mannelijke geslachtshormonen (androgenen) of bijnierschorshormonen (corticosteroiden)
- Sucralfaat, cimetidine of aluminiumhydroxide tegen een maagzweer, colestyramine om uw cholesterolspiegel te verlagen, calcium- of ijzersupplementen. Levothyroxinenatrium Teva drank mag samen met deze geneesmiddelen gebruikt worden, maar niet op dezelfde tijd.
- Chloroquine of proguanil om malaria te voorkomen
- Proteaseremmers (bijvoorbeeld ritonavir, indinavir en lopinavir) voor de behandeling van HIV
- Sevelameer (gebruikt om hoge fosfaatspiegels in het bloed te behandelen bij patiënten met slecht werkende nieren)
- Tyrosinekinaseremmers (bijvoorbeeld imatinib en sunitinib) voor de behandeling van kanker
- Propylthiouracil (gebruikt voor de behandeling van hyperthyreoïdie)
- Bètablokkers (voor de behandeling van hoge bloeddruk en hartproblemen)
- Sympathicomimetische middelen (geneesmiddelen die werken door het stimuleren van sympathische zenuwstelsel)
- Glucocorticosteroiden (steroïdhormonen gebruikt voor de behandeling van onvoldoende werkende bijniere(n) (bijnierinsufficiëntie) en andere ziekten)
- Jodium bevattende contrastmiddelen (gebruikt bloedvaten en organen om beter te kunnen zien tijdens onderzoek met röntgenstraling (radiografie))
- Orlistat (geneesmiddel voor de behandeling van obesitas)

Als u in het ziekenhuis wordt opgenomen voor een operatie, moet u de arts die u onder verdoving brengt (anesthesist) of het medisch personeel laten weten dat u dit middel gebruikt. Het kan namelijk reageren met een bepaald verdovingsmiddel (ketamine) dat aan u kan worden toegediend voor een operatie.

Waarop moet u letten met eten en drinken?

LEVOTHYROXINENATRIUM 25 MICROGRAM/5 ML TEVA
LEVOTHYROXINENATRIUM 50 MICROGRAM/5 ML TEVA
LEVOTHYROXINENATRIUM 100 MICROGRAM/5 ML TEVA
drank

MODULE I: ALGEMENE GEGEVENS

Datum : 22 oktober 2018

1.3.1 : Bijsluiter

Bladzijde : 4

Soja bevattende producten kunnen de opname van levothyroxine verminderen.

Zwangerschap en borstvoeding

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Als u zwanger bent zal uw arts u regelmatig willen controleren.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Het is niet waarschijnlijk dat uw geneesmiddel van invloed is op uw rijvaardigheid of vermogen om machines te gebruiken.

Levothyroxinenatrium Teva drank bevat natriummethylparahydroxybenzoaat en glycerol

Natriummethylparahydroxybenzoaat kan (wellicht vertraagd) allergische reacties veroorzaken. Glycerol kan hoofdpijn, maagklachten en diarree veroorzaken.

3. HOE GEBRUIKT U DIT MIDDEL?

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Dit middel moet worden doorgeslikt.

Uw arts heeft bepaald, afhankelijk van uw aandoening, welke dosis u dagelijks moet innemen. Uw arts zal regelmatig bloedprikken om het effect van de behandeling te meten.

Als u wordt overgezet van de drank naar de levothyroxinetablet of van de tablet naar de levothyroxinedrank, zal uw arts u meer controleren. Hetzelfde geldt wanneer u gaat wisselen tussen verschillende merken van levothyroxine dranken.

Bij hypothyreoïdie zijn de gebruikelijke doseringen:

Volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar:

De begindosering is 50 tot 100 microgram per dag. Dit kan worden verhoogd met 25 tot 50 microgram elke 3-4 weken, totdat u de juiste hoeveelheid inneemt voor uw aandoening. De gebruikelijke uiteindelijke dosering is 100 tot 200 microgram per dag.

Voor krop (struma) of struma die samengaat met schildklierontsteking (Hashimoto-thyreoïditis) is de aanbevolen dosering 50-200 microgram per dag.

Voor de behandeling van schildklierkanker is de aanbevolen dosering 150-300 microgram per dag.

LEVOTHYROXINENATRIUM 25 MICROGRAM/5 ML TEVA
LEVOTHYROXINENATRIUM 50 MICROGRAM/5 ML TEVA
LEVOTHYROXINENATRIUM 100 MICROGRAM/5 ML TEVA
drank

MODULE I: ALGEMENE GEGEVENS

1.3.1 : Bijsluiter

Datum : 22 oktober 2018

Bladzijde : 5

Ouderen (vanaf 50 jaar):

De begindosering is 12,5 microgram per dag, dat elke 2 weken verhoogd kan worden met 12,5 microgram totdat de juiste dosis is bereikt. De gebruikelijke uiteindelijke dosis ligt tussen 50 en 200 microgram per dag. Deze dosering geldt ook voor patiënten met een ernstig verminderde werking van de schildklier (hypothyreoïdie) en met hartaandoeningen.

Kinderen jonger dan 12 jaar:

De dosering voor kinderen is afhankelijk van hun leeftijd, gewicht en de aandoening waarvoor zij de behandeling krijgen. Uw kind zal gecontroleerd worden om er zeker van te zijn dat hij/zij de juiste dosering krijgt toegediend. Geef uw kind dit geneesmiddel minstens een half uur voor de eerste maaltijd van de dag.

Aangeboren (congenitaal) hypothyroïdisme bij baby's:

In het begin 10 tot 15 microgram/kg lichaamsgewicht per dag tijdens de eerste drie maanden. De dosis zal daarna worden aangepast, afhankelijk van de reactie op de behandeling.

Verkregen hypothyroïdisme bij kinderen:

In het begin 12,5 tot 50 microgram per dag. De dosis kan langzaam elke 2 tot 4 weken worden verhoogd, afhankelijk van de reactie op de behandeling.

Wijze van toediening

U moet dit middel op een lege maag innemen, gewoonlijk voor het ontbijt.

Gebruik de meegeleverde (orale) spuit (zie onderstaande uitleg) om uw eigen dosering af te meten.

Als uw dosis bijvoorbeeld 50 microgram per dag is dan is het overeenkomende volume:

Voor de 25 microgram/5 ml sterkte – 2 x 5 ml (totaal 10 ml)

Voor de 50 microgram/5 ml sterkte – 5 ml

Voor de 100 microgram/5 ml sterkte – 2,5 ml

Hoe wordt de (orale) spuit gebruikt:

1. Schud de fles goed, en zorg dat de dop goed op de fles vastzit.
2. Verwijder de dop. Let op: Houd de dop bij de hand om de fles na gebruik af te sluiten.
3. Duw het plastic hulpstuk in de flessenhals. Let op: het hulpstuk moet altijd in de fles blijven.
4. Neem de spuit en controleer of de zuiger er volledig in zit.
5. Houd de fles rechtop en plaats de spuit krachtig in de plastic adapter.
6. Draai de hele fles met de spuit ondersteboven.
7. Trek daarna de zuiger langzaam helemaal naar beneden zodat de spuit met het geneesmiddel wordt gevuld. Duw dan de zuiger helemaal terug om grote luchtballen te laten ontsnappen.
8. Trek daarna de zuiger langzaam terug tot het volume dat u nodig heeft voor uw dosis.
9. Draai de hele fles recht met de spuit erop en haal de spuit van de fles af.

LEVOTHYROXINENATRIUM 25 MICROGRAM/5 ML TEVA
LEVOTHYROXINENATRIUM 50 MICROGRAM/5 ML TEVA
LEVOTHYROXINENATRIUM 100 MICROGRAM/5 ML TEVA
drank

MODULE I: ALGEMENE GEGEVENS

Datum : 22 oktober 2018

1.3.1 : Bijsluiter

Bladzijde : 6

10. De geneesmiddeldosis kan nu direct uit de spuit ingenomen worden. Ga rechtop zitten en duw de zuiger langzaam zodat u de dosis kunt doorslikken.
11. Doe na gebruik de kinderveilige sluiting weer op de fles, waarbij de adapter op zijn plaats blijft.
12. **Schoonmaken:** Veeg na gebruik de buitenkant van de spuit met een droge, schone tissue af.

Duur van de behandeling

De duur van de behandeling is gewoonlijk levenslang als u voor verminderde werking van de schildklier (hypothyreoïdie), krop (struma) of struma die samengaat met schildklierontsteking (Hashimoto-thyreoïditis) behandeld wordt.

Heeft u te veel van dit middel gebruikt?

Als u per ongeluk een overdosering van uw geneesmiddel inneemt, moet u onmiddellijk uw arts bellen of naar de spoedeisende hulpafdeling van het dichtstbijzijnde ziekenhuis gaan. Verschijnselen van een overdosering zijn koorts, onregelmatige hartslag, spierkrampen, hoofdpijn, rusteloosheid, blozen, zweten of diarree.

Neem altijd de rest van het geneesmiddel, de verpakking en het etiket mee, zodat het duidelijk is om welk geneesmiddel het gaat.

Bent u vergeten dit middel te gebruiken?

Als u bent vergeten om uw geneesmiddel in te nemen, neem uw dosis dan in wanneer u het zich herinnert. Neem de volgende dosis daarna gewoon in op de normale tijd. Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen. Als u een aantal doses vergeten bent, moet u dit aan uw arts vertellen bij de volgende controle of bloedonderzoek. Het kan gevaarlijk zijn om met uw geneesmiddel te stoppen zonder advies van uw arts.

Als u zich zorgen maakt, neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Als u stopt met het gebruik van dit middel

Om uw behandeling succesvol te laten zijn, moet u dit middel regelmatig innemen zoals voorgeschreven door uw arts. U moet in geen geval de behandeling veranderen, uitstellen of stoppen zonder contact op te nemen met uw arts. Symptomen van de aandoening kunnen terugkomen bij het uitstellen of stoppen van de behandeling voordat dit zou moeten. De soort symptomen zijn afhankelijk van de onderliggende aandoening.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken. Normaal gesproken treden deze op als uw dosis te hoog is.

LEVOTHYROXINENATRIUM 25 MICROGRAM/5 ML TEVA
LEVOTHYROXINENATRIUM 50 MICROGRAM/5 ML TEVA
LEVOTHYROXINENATRIUM 100 MICROGRAM/5 ML TEVA
drank

MODULE I: ALGEMENE GEGEVENS

1.3.1 : Bijsluiter

Datum : 22 oktober 2018

Bladzijde : 7

Als een van de volgende verschijnselen optreden, moet u stoppen met het innemen van dit middel en onmiddellijk contact opnemen met uw arts of naar de spoedeisende hulpafdeling van het dichtstbijzijnde ziekenhuis gaan

- Zwelling van de handen, voeten, enkels, gezicht, lippen, mond of keel waardoor het slikken of ademen moeilijker wordt.
- Huiduitslag met hevige jeuk en bultjes (galbulten)
- Flauwvallen
- Geelverkleuring van de huid en de ogen, ook wel geelzucht genoemd

Dit zijn allemaal ernstige bijwerkingen. Als deze bij u optreden, heeft u een ernstige allergische reactie op dit middel. U heeft dringend medische hulp nodig of u moet worden opgenomen in het ziekenhuis. Deze zeer ernstige bijwerkingen komen zeer zelden voor.

Neem contact op met uw arts als u een van het volgende bij u optreedt:

Snelle of onregelmatige hartslag, hartkloppingen, pijn op de borst, spierkrampen of spierzwakte, hoofdpijn, rusteloosheid, opgewondenheid, blozen, sterke daling van de bloedsomloop bij te vroeg geboren pasgeborenen met een laag geboortegewicht (zie rubriek 2), zweten, diarree, braken, koorts, menstratiestoornissen, verhoogde bloeddruk in de hersenen, trillen, slapeloosheid, niet tegen warmte kunnen en overmatig gewichtsverlies. Huiduitslag, jeuk en een opgeblazen gevoel kunnen ook optreden.

Zeer zelden, als zeer veel van dit middel in een keer is ingenomen of tijdens enkele jaren, kan onvoldoende pompkracht van het hart (hartfalen) optreden en bewusteloosheid (coma) en overlijden zijn gemeld.

Als u zich niet lekker voelt, op welke manier dan ook, neem dan zo snel mogelijk contact op met uw arts.

Bij kinderen kan haaruitval voorkomen aan het begin van de behandeling. Dit is normaal gesproken alleen tijdelijk en de haargroei zal terugkomen.

Laat u niet afschrikken door deze lijst van mogelijke bijwerkingen. De kans is groot dat geen enkele bij u optreedt.

Het melden van bijwerkingen

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via

LEVOTHYROXINENATRIUM 25 MICROGRAM/5 ML TEVA
LEVOTHYROXINENATRIUM 50 MICROGRAM/5 ML TEVA
LEVOTHYROXINENATRIUM 100 MICROGRAM/5 ML TEVA
drank

MODULE I: ALGEMENE GEGEVENS

Datum : 22 oktober 2018

1.3.1 : Bijsluiter

Bladzijde : 8

het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb, website: www.lareb.nl. Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

5. HOE BEWAART U DIT MIDDEL?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de verpakking na 'EXP'. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Bewaren beneden 25°C

Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen licht.

Levothyroxinenatrium Teva drank is geurloos. Gebruik dit geneesmiddel niet als u merkt dat de drank een geur heeft. Neem contact op met uw apotheker.

Verwijder de rest van het geneesmiddel dat 8 weken na opening over is.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

6. INHOUD VAN DE VERPAKKING EN OVERIGE INFORMATIE

Welke stoffen zitten er in dit middel?

- De werkzame stof in dit middel is levothyroxinenatrium. Elke 5 ml drank bevat levothyroxine overeenkomend met levothyroxinenatrium anhydraat 25 microgram, 50 microgram of 100 microgram.
- De andere stoffen in dit middel zijn: glycerol, citroenzuurmonohydraat, natriummethylparahydroxybenzoaat (E219), natriumhydroxide en gezuiverd water.

Hoe ziet Levothyroxinenatrium Teva eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

Levothyroxinenatrium Teva drank is een heldere, kleurloze vloeistof. Een fles bevat 100 ml drank. Een dubbele polypropyleen lepel met een uiteinde van 5 ml en van 2,5 ml of een plastic doseerspuit (pipet) worden ook bijgeleverd als doseerhulp.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Teva Nederland B.V.

LEVOTHYROXINENATRIUM 25 MICROGRAM/5 ML TEVA
LEVOTHYROXINENATRIUM 50 MICROGRAM/5 ML TEVA
LEVOTHYROXINENATRIUM 100 MICROGRAM/5 ML TEVA
drank

MODULE I: ALGEMENE GEGEVENS

1.3.1 : Bijsluiter

Datum : 22 oktober 2018

Bladzijde : 9

Swensweg 5
2031 GA Haarlem
Nederland

Fabrikant
Pharmachemie BV
Swensweg 5
2031 GA Haarlem
Nederland

Teva Pharma BV
Swensweg 5
2031 GA Haarlem
Nederland

Famar Nederland BV
Industrieweg 1
5531 AD Bladel
Nederland

In het register ingeschreven onder:

RVG 108721, Levothyroxinenatrium 25 microgram/5ml Teva, drank

RVG 108724, Levothyroxinenatrium 50 microgram/5ml Teva, drank

RVG 108725, Levothyroxinenatrium 100 microgram/5ml Teva, drank

Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen:

| | |
|---------------------|--|
| Duitsland | Levothyroxin-ratiopharm 25µg/5ml Lösung zum Einnehmen Levothyroxin-ratiopharm 50µg/5ml Lösung zum Einnehmen Levothyroxin-ratiopharm 100µg/5ml Lösung zum Einnehmen |
| Verenigd Koninkrijk | Levothyroxine 25 micrograms/5ml Oral Solution Levothyroxine 50 micrograms/5ml Oral Solution Levothyroxine 100 micrograms/5ml Oral Solution |
| Nederland | Levothyroxinenatrium 25 microgram/5ml Teva, drank Levothyroxinenatrium 50 microgram/5ml Teva, drank Levothyroxinenatrium 100 microgram/5ml Teva, drank |

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in mei 2018.

LEVOTHYROXINENATRIUM 25 MICROGRAM/5 ML TEVA
LEVOTHYROXINENATRIUM 50 MICROGRAM/5 ML TEVA
LEVOTHYROXINENATRIUM 100 MICROGRAM/5 ML TEVA
drank

MODULE I: ALGEMENE GEGEVENS
1.3.1 : Bijsluiter

Datum : 22 oktober 2018
Bladzijde : 10

1018.8v.AV