

Lees deze bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u. Dit homeopathische geneesmiddel is verkrijgbaar zonder doktersvoorschrift (recept), waarbij advies van een arts niet noodzakelijk is. Toch blijft het belangrijk om OPSONAT SPAG. PEKANA® zorgvuldig te gebruiken om een goed resultaat te bereiken.

- Bewaar deze bijsluiter, het kan nodig zijn om deze nogmaals door te lezen.
- Vraag uw apotheek er om meer informatie of advies indien nodig.
- Raadpleeg een arts indien de verschijnselen verergeren of binnen 14 dagen niet verbeteren.

OPSONAT SPAG. PEKANA®

Inhoud van deze bijsluiter

1. Wat is OPSONAT SPAG. PEKANA® en waarvoor wordt het gebruikt?
2. Wat moet u weten, voordat u OPSONAT SPAG. PEKANA® gebruikt?
3. Hoe wordt OPSONAT SPAG. PEKANA® gebruikt?
4. Mogelijke bijwerkingen.
5. Hoe bewaart u OPSONAT SPAG. PEKANA®?

Samenstelling van OPSONAT SPAG. PEKANA®

De bestanddelen per 100 gram druppels zijn:

Nitricum acidum	D6	14,5 g
Sulphuricum acidum	D6	12,5 g
Bellis perennis spag.	D4	14,5 g
Cantharis vesicatoria	D12	8,5 g
Glechoma hederacea spag.	D4	14,5 g
Gratiola officinalis	D4	14,5 g
Hydrastis canadensis	D6	12,5 g
Lachesis mutus	D12	8,5 g

De andere bestanddelen (hulpstoffen) zijn: Ethanol, water.

Alcoholgehalte ca. 19% (v/v)

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant:

PEKANA® Naturheilmittel GmbH,
Raiffeisenstrasse 15
D-88353 Kisslegg

Voor correspondentie en inlichtingen:

TIMM Health Care BV
Bosberg 41, 7271 LE Borculo
info@timmhealthcare.nl

In het register voor homeopathische farmaceutische producten ingeschreven onder RVH 91707

1. Wat is OPSONAT SPAG. PEKANA® en waarvoor wordt het gebruikt?

Toepassingen

OPSONAT SPAG. PEKANA® is een homeopathisch geneesmiddel zonder specifieke therapeutische indicatie toegepast volgens de principes van de homeopathische geneeswijze.

2. Wat moet u weten voordat u OPSONAT SPAG. PEKANA® gebruikt?

Wanneer mag u OPSONAT SPAG. PEKANA® niet gebruiken?

Er zijn geen omstandigheden bekend waarbij u OPSONAT SPAG. PEKANA® niet mag gebruiken.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met OPSONAT SPAG. PEKANA®?

Er zijn geen omstandigheden bekend waarbij u extra voorzichtig met OPSONAT SPAG. PEKANA® moet zijn.

Gebruik van OPSONAT SPAG. PEKANA® in combinatie met voedsel en drank

Gebruik OPSONAT SPAG. PEKANA® liever niet in combinatie met voedsel, maar bij voorkeur een half uur vóór, of een uur na de maaltijd.

Gebruik tijdens de zwangerschap en/of borstvoeding

Voor zover bekend kan dit homeopathische geneesmiddel zonder bezwaar worden gebruikt tijdens de zwangerschap en de periode van borstvoeding, overeenkomstig de aanbevolen dosering.

Rijvaardigheid en gebruik van machines

Gezien de lage dosering worden de rijvaardigheid en het vermogen om machines te gebruiken naar verwachting niet beïnvloed.

Gebruik van OPSONAT SPAG. PEKANA® in combinatie met andere geneesmiddelen

Tot op heden zijn van dit geneesmiddel geen interacties met andere geneesmiddelen bekend.

3. Hoe wordt OPSONAT SPAG. PEKANA® ingenomen/gebruikt?

Dosering en gebruik

Tenzij anders voorgeschreven:

Volwassenen en kinderen vanaf 6 jaar: normaal 3 maal daags 10 druppels. Zo nodig om de 15 minuten, over een periode van maximaal 2 uur, 5 druppels.

Kinderen (2-6 jaar): 3 maal daags 5 druppels. Zo nodig om de 15 minuten, over een periode van maximaal 2 uur, 3 druppels.

OPSONAT SPAG. PEKANA® bij voorkeur een half uur voor of minstens één uur na de maaltijd innemen. De druppels kunnen onverdund of met een kleine hoeveelheid water vermengd ingenomen worden.

Wanneer na 14 dagen onafgebroken gebruik geen verbetering van de klachten wordt bemerkt of wanneer de klachten terugkeren, dient een arts te worden geraadpleegd.

Wat moet u doen wanneer u te veel van OPSONAT SPAG. PEKANA® heeft ingenomen?

Volgens de homeopathie is het effect afhankelijk van het aantal potentiestappen en niet zozeer van de dosering. Ook bij een dubbele dosis zijn geen bijwerkingen te verwachten.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten OPSONAT SPAG. PEKANA® in te nemen?

Neem nooit een dubbele dosis van OPSONAT SPAG. PEKANA® om zo de vergeten dosis in te halen.

Effecten die u kunt verwachten wanneer de behandeling met OPSONAT SPAG.

PEKANA® wordt gestopt

Bij het stoppen van de behandeling met OPSONAT SPAG. PEKANA® treden geen speciale verschijnselen op.

Speciale waarschuwingen en speciale voorzorgen bij gebruik

Het is bij homeopathische geneesmiddelen altijd mogelijk dat er een beginverergering optreedt in de eerste week van inname. Dit betekent dat de klachten in eerste instantie juist toenemen in plaats van afnemen. Stop in dit geval de inname van het middel en begin een paar dagen later met de halve dosering.

Dit middel bevat 42 mg alcohol (ethanol) per 10 druppels en 21 mg alcohol (ethanol) per 5 druppels. De hoeveelheid per 10 druppels in dit middel komt overeen met minder dan 2 ml bier of 1 ml wijn. De hoeveelheid per 5 druppels in dit middel komt overeen met minder dan 1 ml bier of 1 ml wijn.

Er zit een kleine hoeveelheid alcohol in dit middel. Dit is zo weinig dat u hier niets van merkt.

4. Mogelijke bijwerkingen

Er zijn van OPSONAT SPAG. PEKANA® geen bijwerkingen bekend.

In geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld of die u als ernstig ervaart, informeer dan uw arts of apotheker.

5. Hoe bewaart u OPSONAT SPAG. PEKANA®?

Bewaren in de originele verpakking, beneden 25°C.

Na gebruik de verpakking onmiddellijk sluiten. Na opening van de flacon is de inhoud nog 6 maanden houdbaar.

OPSONAT SPAG. PEKANA® buiten bereik en zicht van kinderen houden!

Uiterste gebruiksdatum

Gebruik OPSONAT SPAG. PEKANA® niet meer na de datum op de verpakking en het etiket achter "niet te gebruiken na" (de eerste twee cijfers duiden de maand aan, de vier volgende het jaartal).

| Deze bijsluiter is voor het laatst herzien in 11-2021.